**UE90, QCM Internat
Virologie générale**

Dorine Bonte (dorine.bonte@universite-paris-saclay.fr)

21 mars 2024

Organisation des séances de virologie UE90 et UE94

☞ UE90 (4A PHBMR)

1 séance QCM Virologie générale (2 h)

1 séance DBT VIH avec Pharmacie clinique (2 h)

1 séance DBT Hépatites virales avec Pharmacie clinique (2 h)

1 séance DBT Femme enceinte et infections virales avec Pharmacie clinique (2 h)

☞ UE94 (5A PHBMR)

1 séance QCM Virologie appliquée (3 h)

1 séance complémentaire = séance de révisions avec DBT, QCM de révisions et tableaux de synthèse... (3 h)

Rq : Pour chaque séance de QCM ⇒ révision des **11 virus au programme de l'internat** (HSV-1/2, CMV, entérovirus, rotavirus, virus de la grippe, HPV, VIH, VHA, VHB, VHC et virus de la rubéole)

Virus Herpès simplex

HSV

↳ Famille des *Orthoherpesviridae*

Sous-famille des *Alphaherpesvirinae*

Genre *Simplexvirus*

2 sérotypes

↳ HSV-1 et HSV-2

↳ Virus enveloppé

Taille 150 à 200 nm

↳ Tégument

↳ Capside

- icosaédrique

- 162 capsomères

↳ Génome

- ADN double brin, linéaire

- 152 kpb

Épidémiologie HSV-1 et HSV-2

- ☞ Infections très fréquentes
- ☞ Virus strictement humains et ubiquitaires
- ☞ Tropisme cutanéomuqueux et neurotropisme
 - ⇒ latence au niveau des ganglions nerveux sensitifs
- ☞ Excrétion virale souvent asymptomatique
- ☞ Primo-infection
 - HSV-1 ⇒ pendant la petite enfance 1 - 3 ans
 - HSV-2 ⇒ possible dès les premiers rapports sexuels
- ☞ Séroprévalence chez l'adulte fonction des conditions socio-économiques
 - HSV-1 ⇒ 70 % dans les pays industrialisés, 95 % dans les PVD
 - ↳ de + en + d'infection au niveau génital
 - HSV-2 ⇒ 5 - 30 % dans les pays industrialisés, 20 - 80 % dans les PVD
 - ↳ en augmentation
 - ↳ sujets jeunes

Modes de transmission

↳ Transmission par contact direct

↳ sexuelle ou salivaire ou contact au niveau des lésions

↳ Transmission verticale

- grossesse

- accouchement +++

- post-natale

Diagnostic

⇒ Diagnostic biologique non systématique

↳ Échantillons biologiques

- * Sang (sérum ou sang total)
- * Écouvillonnage des lésions cutanéomuqueuses
- * LCS

↳ Diagnostic direct (à privilégier)

* Recherche du génome viral

PCR qualitative ou quantitative en temps réel

↳ typage HSV-1 ou HSV-2

* Recherche du virus par culture sur cellules MRC5

Culture facile et rapide (24 - 48 h) avec ECP caractéristique

* Recherche des antigènes viraux

ELISA, Immunofluorescence (sur cellules)

↳ Diagnostic indirect

↳ le plus souvent inutile, sauf études épidémiologiques

Cytomégalovirus humain

Cytomégalo­virus humain

↳ Famille des *Orthoherpesviridae*

Sous-famille des *Betaherpesvirinae*

Genre *Cytomegalovirus*

↳ Virus enveloppé

Taille 150 à 200 nm

↳ Tégument

↳ Capside

- icosaédrique

- diamètre de 100 nm

- 162 capsomères

↳ Génome

- ADN double brin, linéaire

- 230 à 250 kpb ⇒ le plus gros génome des *Orthoherpesviridae*

Épidémiologie du CMV

☞ **Virus ubiquitaire et endémique**

☞ **Séroprévalence**

80 - 100 % dans les PVD

50 % en France

☞ **Homme**

= unique réservoir du virus

☞ **Infection préférentiellement acquise à deux périodes de la vie**

- la petite enfance

☞ **infection qui survient tôt dans les collectivités d'enfants comme les crèches**

- le début de l'âge adulte

☞ **transmission sexuelle, pic de séroconversion observé chez l'adolescent et l'adulte jeune**

Modes de transmission

☞ **Transmission par contact direct**

☞ **sexuelle ou salivaire**

☞ **Transmission par voie sanguine**

☞ **Transmission verticale**

- **grossesse**

- **accouchement**

- **post-natale**

Diagnostic (1)

↳ Échantillons biologiques

- * Sang (sérum ou sang total)
- * Liquide amniotique
- * LCS
- * Urines

↳ Diagnostic direct (à privilégier)

- * Recherche du génome viral

PCR quantitative en temps réel

- * Antigénémie pp65 (n'est plus utilisée en France)

IF de la protéine pp65

↳ test quantitatif (sur 200 000 polynucléaires)

- * Recherche du virus par culture

Culture classique sur cellules MRC5 avec ECP lent

Culture rapide (24 h) avec mise en évidence par IF des antigènes viraux très précoces (IEA)

Diagnostic (2)

☞ Diagnostic indirect

* Recherche d'anticorps spécifiques

ELISA (IgM et IgG)

Test d'avidité des IgG

Entérovirus

Classification

↳ Famille

* *Picornaviridae*

↳ Genres et espèces

* *Enterovirus*

- Entérovirus humain A (> 12 sérotypes)
- Entérovirus humain B (> 36 sérotypes)
- Entérovirus humain C (> 11 sérotypes)
 - ↳ Poliovirus (3 sérotypes 1, 2 et 3)
- Entérovirus humain D (2 sérotypes)
- Rhinovirus A, B et C

Les entérovirus

↳ Virus nus

Taille environ 30 nm

↳ Capside

- icosaédrique

- 60 capsomères (VP1 à VP4)

↳ Génome

- ARN monocaténaire de polarité positive, linéaire

- 7,5 kb

↳ une seule polyprotéine clivée en protéines enzymatiques et protéines de structure

Tropisme et transmission

☞ Tropisme

- tube digestif
- système nerveux

☞ Transmission

Essentiellement féco-orale

☞ directe ou indirecte par l'alimentation, les coquillages, l'eau contaminée

Possible par la salive (aérienne)

☞ Épidémies

Été et début d'automne

☞ Incidence élevée

Résistance des entérovirus

↳ **Résistance physico-chimique importante**

↳ **Résistants à la plupart des désinfectants**

⇒ alcool, éther, détergents

↳ **Résistants à la chloration habituelle des eaux**

↳ **Résistants aux enzymes digestives**

↳ **Sensibles à certaines molécules halogénées**

⇒ eau de javel, iode

↳ **Sensibles à certains aldéhydes**

⇒ formol

Diagnostic

↳ Échantillons biologiques

- * selles
- * sérum
- * LCS
- * prélèvement au niveau de la gorge

↳ Diagnostic direct

- * Isolement sur culture cellulaire (ECP, IF) (n'est plus utilisé en pratique)
- * Recherche du génome par RT-PCR
- * Génotypage pour suivi épidémiologique

↳ Diagnostic indirect

- * Intérêt limité
 - ↳ pour l'évaluation de l'immunité post-vaccinale contre le poliovirus

Rotavirus

Classification

☞ Famille

* *Sedoreoviridae*

☞ Genre et espèces

* *Rotavirus*

- Rotavirus A

- Rotavirus B

- Rotavirus C

Les rotavirus

☞ Virus nus

Taille moyenne 80 nm

☞ Capside

- icosaédrique
- complexe avec 3 couches de protéines

☞ Génome

- ARN double brin, linéaire
- 11 segments
 - ↳ monocistroniques sauf fragment 11 codant 2 protéines
 - ↳ de taille variable (au total 18 kb)

☞ Réplication intracytoplasmique

dans les entérocytes humains

Groupes et types de rotavirus

☞ 9 groupes de A, B, C, D, F, G, H, I et J

A, B et C infectent les humains

Sérogroupe A le plus fréquent

VP6 = Ag de la capside de groupe

☞ Type G et type P

VP7 = définit le type G

VP4 = définit le type P

↳ anticorps neutralisants dirigés contre la capside externe

☞ Dans le monde

↳ plus de 90 % des souches humaines sont de type G1P[8], G2P[4], G3P[8] et G4P[8]

☞ En France

↳ types G1 à G4

↳ prédominance du type G1P[8]

Transmission

👉 Réservoirs

Nombreuses espèces animales

👉 Transmission

Surtout de personne à personne

Transmission féco-orale

↳ directe ou indirecte par l'alimentation, les coquillages, l'eau contaminée

👉 Éléments favorisant cette transmission

Faible dose infectieuse

Longue durée d'excrétion du virus dans les selles des sujets infectés

↳ 10^{11} particules virales par gramme de selles

↳ seuls 10 virus suffisent pour infecter un enfant

Grande résistance dans l'environnement

Épidémies hivernales

↳ chez les enfants de moins de 3 ans

Infections nosocomiales

Épidémiologie

- 👉 **Portage asymptomatique**

 - ↳ **chez les adultes**

- 👉 **30 à 40 % des causes de diarrhées aiguës infectieuses de l'enfant**

 - ↳ **chez l'enfant jeune**

- 👉 **Principale cause de mortalité infantile dans les PVD**

- 👉 **500 000 morts par an chez les enfants de moins de 5 ans**

- 👉 **En France**

 - ↳ **en moyenne 13 à 14 décès par an**

Diagnostic

⇒ **Diagnostic biologique non systématique**

↳ **Échantillons biologiques**

* Selles (à la phase aiguë)

↳ **Diagnostic direct (à privilégier)**

* Recherche d'antigènes viraux

ELISA ou agglutination de particules de latex

Immunochromatographie (TDR)

* Recherche du génome

RT-PCR

* Culture (difficile en routine)

↳ **Diagnostic indirect**

* Sans intérêt diagnostique

Virus de la grippe

Classification

☞ Famille

- * *Orthomyxoviridae*

☞ Espèces

- * *Influenzavirus A*

- * *Influenzavirus B*

- * *Influenzavirus C*

- * *Influenzavirus D*

Le virus de la grippe

☞ Virus enveloppé

Grande taille (100 nm)

Virus polymorphe

Enveloppe porteuse

- d'hémagglutinines (H1 à H17 pour les virus A)
- de neuraminidases (N1 à N12 pour les virus A)

☞ Matrice

Protéine M1

☞ Capside

Symétrie hélicoïdale

☞ Génome

ARN monocaténaire linéaire de polarité négative

Génome segmenté

Environ 14 kb au total

Tropisme et contamination

↳ Tropisme

⇒ cellules de l'arbre respiratoire humain

↳ Contamination par

* voie aérienne (toux, éternuements)

* voie indirecte par contact (mains)

↳ Transmission

* interhumaine le plus souvent

* zoonotique possible

↳ **Épidémies hivernales annuelles ou pandémies**

Les glissements antigéniques

- ☞ **Variations antigéniques mineures**
 - HA et NA, mais surtout HA
- ☞ **Mutations ponctuelles des gènes codant HA ou NA**
- ☞ **Apparition de nouveaux variants viraux de façon continue**
- ☞ **Pour les virus de types A et B, peu pour le type C**
- ☞ **À l'origine des épidémies annuelles**
- ☞ **À l'origine de la réactualisation du vaccin**

Les cassures antigéniques

- ☞ **Variations antigéniques majeures**
- ☞ **Apparition brutale**
- ☞ **Échange de segments de gènes entre sous-types de virus**
- ☞ **Nouveaux virus produits de façon régulière**
- ☞ **Uniquement pour le virus de type A**
- ☞ **À l'origine des pandémies de grippe**

Réassortiment du virus de la grippe A

Épidémiologie

↳ **Épidémies hivernales : maladie saisonnière**

Virus A : H3N2, H1N1

Virus B : lignage Yamagata et Victoria

↳ **Pandémies**

Risques liés aux virus aviaires A H5N1, A H7N9 et A H9N2

↳ **virus virulents, peu adaptés à l'homme**

A H1N1 pdm 2009-2010

↳ **virulence classique, adapté à l'homme**

Diagnostic

⇒ **Diagnostic biologique non systématique**

↳ **Échantillons biologiques**

- * **Aspiration nasopharyngée**
- * **Écouvillonnage nasopharyngé**

↳ **Diagnostic direct**

- * **Recherche du génome viral**
RT-PCR (GeneXpert) ou PCR multiplex possible (après RT)
- * **Recherche d'antigènes viraux**
ELISA ou immunofluorescence
Immunochromatographie (TDR)
- * **Recherche du virus par culture (pas en routine)**

↳ **Diagnostic indirect**

- * **Intérêt rétrospectif**

Papillomavirus humains

Papillomavirus (1)

☞ Famille des *Papillomaviridae*

Genre *Papillomavirus*

☞ Virus nu

Taille 45 à 55 nm

☞ Capside

- icosaédrique

- 72 capsomères

☞ Génome

- ADN bicaténaire circulaire

- 8 kpb environ, un seul brin codant

Papillomavirus (2)

- ☞ **Virus ubiquitaire**
- ☞ **> 200 géotypes strictement humains**
- ☞ **Transmission**
 - directe par contact (sexuel, accouchement)
 - indirecte (objet, sol des piscines)
- ☞ **Tropisme épithélial**
 - virus à tropisme cutané
 - virus à tropisme muqueux (génital et sphère ORL)
- ☞ **Persistance possible**
 - ⇒ épisome ou intégration
- ☞ **Virus à haut risque et virus à bas risque**
 - = oncogènes et non oncogènes

Diagnostic

- ⇒ Diagnostic biologique non systématique
- ⇒ Diagnostic cytohistologique des condylomes
- ⇒ Diagnostic anatomopathologique sur les biopsies

👉 Échantillons

- Frottis cervico-utérin ou anal
- Biopsie (colposcopie)

👉 Diagnostic direct

- Recherche du génome viral
 - PCR, hybridation, hybridation *in situ*
- Typage haut risque ou bas risque par hybridation ou séquençage

👉 Diagnostic indirect

- ↳ non fait en pratique

👉 Cytologie

Recherche de koïlocytes (cellules caractéristiques) sur frottis cervico-utérin ou anal

Virus de l'immunodéficience humaine

Classification

☞ Famille

* *Retroviridae*

☞ Sous-famille

* *Orthoretrovirinae*

☞ Genres et espèces

* *Alpha-, Beta-, Epsilon- et Gammaretrovirus*

↳ tumeurs et leucémies chez les animaux

* *Deltaretrovirus*

HTLV-1 et HTLV-2

↳ leucémies chez l'homme

* *Lentivirus*

VIH-1 et VIH-2

SIV

FIV

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

☞ **Virus enveloppé**

Taille 90 à 120 nm

☞ **Capside**

- icosaédrique de symétrie conique tronquée

☞ **Génome**

- diploïde

- ARN monocaténaire, linéaire et de polarité positive, 9,2 kb

Génome

VIH-1

VIH-2

Modes de transmission

Sexual
Contact

↳ Voie sexuelle

- 80 % des nouvelles infections dans le monde
- plus de 90 % en Afrique

Injection
Drug Use

↳ Voie sanguine

Pregnancy, Childbirth
& Breast Feeding

↳ Transmission de la mère à l'enfant

- la grossesse
- l'accouchement +++
- l'allaitement

Virus de l'hépatite A

Classification

☞ Famille

* *Picornaviridae*

☞ Genres et espèces

* *Enterovirus*

- Entérovirus humain A

- Entérovirus humain B

- Entérovirus humain C

☞ Poliovirus (3 sérotypes 1, 2 et 3)

- Entérovirus humain D

- Rhinovirus A, B et C

* *Hepatovirus*

- Virus de l'hépatite A

Le virus de l'hépatite A (VHA)

- ☞ **Virus de petite taille**

 - environ 30 nm de diamètre

- ☞ **Virus nu**

 - capside à symétrie icosaédrique

- ☞ **Génome**

 - ARN simple brin de polarité positive, linéaire, 8 kb

- ☞ **Réplication intracytoplasmique dans les hépatocytes humains**

 - ☞ virus strictement humain

- ☞ **Cas sporadiques ou petites épidémies**

- ☞ **Très grande résistance aux agents physico-chimiques**

Transmission

☞ **Transmission féco-orale directe ou indirecte**

☞ **Transmission par voie sanguine possible**

* par le sang et ses dérivés

☞ mais uniquement en cas de prélèvement pendant la courte phase de virémie

☞ **Transmission par voie sexuelle**

☞ lors de rapports oro-génitaux

☞ **Pas de transmission verticale**

Diagnostic

↳ Échantillons biologiques

- * Sang (sérum)

- * Selles

↳ Diagnostic direct

- * Recherche du génome viral

 - RT-PCR (non fait en pratique)

↳ Diagnostic indirect

- * Recherche d'anticorps spécifiques

 - IgM en cas de suspicion d'hépatite A aiguë

 - IgG pour contrôle de l'immunité post-vaccinale ou post-infectieuse

Virus de l'hépatite B

Le Virus de l'Hépatite B (1)

☞ Famille des *Hepadnaviridae*

Genre *Orthohepadnavirus*

☞ Virus hépatotrope

- Réplication intranucléaire principalement dans les hépatocytes humains

- Persistance possible

☞ épisode ou intégration

☞ Virus polymorphe

* 3 structures observées en microscopie électronique

- particules infectieuses de 42 nm

= « particules de Dane »

- particules sphériques de 22 nm

- tubules ou filaments de 22 nm de diamètre et 200 à 700 nm de longueur

☞ 10 génotypes A à J

Le Virus de l'Hépatite B (2)

☞ Virus enveloppé

- taille 42 - 47 nm
- antigène HBs

☞ Capside

- icosaédrique
- antigène HBc

☞ Génome

- ADN circulaire de 3 200 pb
- partiellement bicaténaire

Génome et protéines virales

☞ 4 cadres de lecture chevauchants

- * la région *préC/C* code l'antigène HBe
- * la région *C* code la protéine de la nucléocapside ⇨ antigène HBc
- * la région *préS1/préS2/S* code les protéines de l'enveloppe virale ⇨ antigène HBs
- * la région *P* code l'ADN polymérase ARN/ADN dépendante
- * la région *X* code la protéine transactivatrice X ⇨ antigène HBx

Cycle de multiplication virale

Modes de transmission

- ☞ **Transmission par voie sanguine**
- ☞ **Transmission par voie sexuelle**
- ☞ **Transmission horizontale**
- ☞ **Transmission verticale mère/enfant**
 - à l'accouchement +++
 - en période néonatale
 - passage transplacentaire possible

Diagnostic

↳ Échantillons biologiques

- * Sang (sérum ou plasma)
- * Biopsie hépatique

↳ Diagnostic direct

- * Recherche du génome viral

PCR quantitative ou hybridation moléculaire

- * Recherche d'antigènes viraux spécifiques (ELISA, IF, immunoperoxydase)

Antigène HBs (sérum et biopsie)

Antigène HBe (sérum)

Antigène HBc (biopsie)

↳ Diagnostic indirect

- * Recherche d'anticorps spécifiques (ELISA)

Anticorps anti-HBs

Anticorps anti-HBc (anticorps totaux ou IgM)

Anticorps anti-HBe

Virus de l'hépatite C

Le Virus de l'Hépatite C (1)

☞ **Famille des *Flaviviridae***

Genre *Hepacivirus*

☞ **Réplication cytoplasmique**

⇒ principalement dans les hépatocytes humains

☞ **Persistance possible**

↳ réplication continue, pas de latence

☞ **8 géotypes**

☞ **Virus non cultivable**

Le Virus de l'Hépatite C (2)

☞ Virus enveloppé

Taille moyenne 60 nm

Polymorphe

☞ Capside

- symétrie icosaédrique

☞ Génome

- ARN linéaire, monocaténaire de polarité positive

- 9,6 kb

Du génome à la polyprotéine du virus de l'hépatite C

Modes de transmission

- ↳ **Transmission par voie sanguine**
- ↳ **Transmission verticale mère/enfant**
< 5 %
- ↳ **Transmission par voie sexuelle exceptionnelle**
via le sang

Diagnostic

↳ Échantillons biologiques

- * Sang (sérum ou plasma)

↳ Diagnostic direct

- * Recherche du génome viral
 - RT-PCR quantitative, TMA ou hybridation moléculaire (bDNA)
détection et quantification
- * Génotypage
 - séquençage du génome viral ou hybridation
- * Recherche d'antigènes viraux spécifiques
 - ELISA

↳ Diagnostic indirect

- * Recherche d'anticorps spécifiques anti-VHC
 - ELISA

Virus de la rubéole

Le Virus de la rubéole

↳ Famille des *Matonaviridae*

Genre *Rubivirus*

↳ Virus enveloppé

Taille moyenne de 70 nm

↳ Capside

- icosaédrique

↳ Génome

- ARN linéaire, monocaténaire de polarité positive

- 10 kb

↳ Réplication cytoplasmique

dans de nombreuses cellules humaines

Épidémiologie

- ↳ **Virus strictement humain**
- ↳ **Virus très fragile**
- ↳ **Contamination par voie aérienne**
- ↳ **Transmission materno-foetale**
 - ↳ **problème chez les femmes enceintes séronégatives**
- ↳ **Cas sporadiques ou épidémies vernales**
 - ↳ **enfants ou jeunes adultes**

Diagnostic

↳ Échantillons biologiques

- * Sérum
- * Liquide amniotique ou sang fœtal
- * Sang ou LCS (nouveau-né)

↳ Diagnostic direct

- * Recherche du génome viral
RT-PCR
- * Recherche du virus par culture
rarement réalisée car difficile

↳ Diagnostic indirect

- * Recherche d'anticorps spécifiques
ELISA, IHA, technique agglutination