

Question	Mots clés	Points
Question 1	Hypersensibilité	1
	Allergie	1
	Type 1	1
	Immédiate	1
	anaphylaxie	2
	prise d'amoxicilline/allergène	1
	délai 20 min /inférieur à 1h	1
	vertiges	1
	vomissements	1
	étouffement/difficulté respiratoire	1
	plaques rouges/érythème/urticaire	1
	oedemes/angiodème/gonflement	1
Question 2	première exposition =NON	2
	phase de sensibilisation/immunisation	1
	IgE	1
	réponse humorale	1
	cellules présentatrices d'Ag	1
	lymphocytes T	1
	Th2	1
	lymphocytes B	1
	plasmocytes	1
Question 3	adrénaline	2
	IM	1
	IV	1
	vasoconstricteur	1
	bronchodilatateur	1
	chronotrope	1
	bathmotrope	1
	inotrope	1
	effet cardiaque	1
	disponible en officine =OUI	1
stylo auto-injecteur	1	
Question 4	oxygène	2
	salbutamol/b2 agoniste	1
Question 5	histamine	1
	30 min	1
	tryptase	2
	1h-5h	1
Question 6	Eviter toutes les B-lactamines	2
	porter une carte d'allergique sur lui	1
Question 7	interrogatoire	1
	tests cutanés/pricks tests	2
	dosage IgE spécifiques amoxicilline	1
		1
Question 8	Tests réintroduction/provocation/exposition	2
	risque d'anaphylaxie/réaction systémique	2
	patient perfusé	1
	adrénaline prête	1
	chariot de réanimation présent	1
	reprise possible si réintroduction négative =OUI	2