Résumé sur la composition de DL

Methode pour faire une composition de DL

Exemple : Soit $f(x)$ une fonction usuelle pour les DL et $g(x) = 2 - 2x + 3x^2 + 4x^3 + x^3\varepsilon(x)$

On veut calculer le DL de $f(g(x))$

1. Si $f(x) = e^x$

(a) Alors on écrit (en utilisant $e^{a+b} = e^a e^b$)

$$e^{2-2x+3x^2+4x^3} = e^2 e^{\underbrace{-2x+3x^2+4x^3}_{h(x)}} \quad (1)$$

(b) puis on calcule le DL de $e^{h(x)}$

2. Si $f(x) = \cos(x)$ ou $f(x) = \sin(x)$

(a) Alors on écrit (en utilisant les formules d'additions $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$ et $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$)

$$\cos(2-2x+3x^2+4x^3) = \cos(2)\cos(\underbrace{-2x+3x^2+4x^3}_{h(x)}) - \sin(2)\sin(\underbrace{-2x+3x^2+4x^3}_{h(x)}) \quad (2)$$

$$\sin(2-2x+3x^2+4x^3) = \sin(2)\cos(\underbrace{-2x+3x^2+4x^3}_{h(x)}) + \sin(\underbrace{-2x+3x^2+4x^3}_{h(x)})\cos(2) \quad (3)$$

(b) Puis on calcule le DL de $\cos(h(x))$ et $\sin(h(x))$

3. Si $f(x) = \frac{1}{x}$ ou $f(x) = \sqrt{x}$ ou $f(x) = \ln(x)$

(a) Alors on écrit (en factorisant par 2) :

$$\frac{1}{2-2x+3x^2+4x^3} = \frac{1}{2\left(1-\frac{2}{2}x+\frac{3}{2}x^2+\frac{4}{2}x^3\right)} = \frac{1}{2} \frac{1}{\underbrace{1-\frac{2}{2}x+\frac{3}{2}x^2+\frac{4}{2}x^3}_{h(x)}} \quad (4)$$

$$\ln(2-2x+3x^2+4x^3) = \ln\left(2\left(1-\frac{2}{2}x+\frac{3}{2}x^2+\frac{4}{2}x^3\right)\right) = \ln(2) + \ln\left(\underbrace{1-\frac{2}{2}x+\frac{3}{2}x^2+\frac{4}{2}x^3}_{h(x)}\right) \quad (5)$$

$$\sqrt{2-2x+3x^2+4x^3} = \sqrt{2\left(1-\frac{2}{2}x+\frac{3}{2}x^2+\frac{4}{2}x^3\right)} = \sqrt{2} \sqrt{\underbrace{1-\frac{2}{2}x+\frac{3}{2}x^2+\frac{4}{2}x^3}_{h(x)}} \quad (6)$$

(b) Puis on calcule le DL de $\frac{1}{1+h(x)}$ ou $\ln(1+h(x))$ ou $\sqrt{1+h(x)}$

Chapitre 4 : Equivalents et développements asymptotiques

Equivalents

En gros, on va dire que deux fonctions sont 'équivalentes' en un point a si elles sont le même comportement autour de a . Voici la définition précise. On peut en donner une définition directe mais le plus simple est de se ramener à la définition qu'on vient de voir de la négligeabilité.

Définition 1 : Fonctions équivalentes

Soit f, g deux fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ un élément de I ou l'une de ses bornes.

On dit que f est équivalente à g au voisinage de a si $f(x) = (1 + \varepsilon(x))g(x)$ au voisinage de a .

On note

$$f \sim g,$$

ou bien lorsqu'on a besoin de précision, $f(x) \sim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Si g ne s'annule pas autour de a , on a la définition équivalente, mais plus facile à manipuler :

Définition 2 :

Supposons que $g(x) \neq 0$ pour tout x dans un voisinage de a (g peut s'annuler en a).

Alors on a $f \sim g$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

Preuve :

Supposons que $f \sim g$. Alors $f(x) = (1 + \varepsilon(x))g(x)$ pour une fonction ε qui tend vers 0 en a , donc $\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \varepsilon(x)$ tend vers 1.

Réciproquement, si $\frac{f(x)}{g(x)}$ tend vers 1, alors on peut définir $\varepsilon(x) = \frac{f(x)}{g(x)} - 1$ et par conséquent ε tend vers 0 en a . Donc $f(x) = (1 + \varepsilon(x))g(x)$, qui donne $f \sim g$.

En particulier, si $f \sim_a g$, alors f et g ont la même limite en a .

Remarque 1 :

Si f admet une limite finie $\ell \neq 0$ lorsque x tend vers a , alors on a $f \sim_{x \rightarrow a} g$ si et seulement si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

L'utilisation du mot "équivalent" est en partie justifié par la proposition suivante.

Proposition 1 :

- On a $f \sim g$ si et seulement si $g \sim f$.
- Supposons que $f \sim g$ et $g \sim h$ en un même point a . Alors on a $f \sim h$.

Proposition 2 :

Si f a un DL d'ordre n en 0 , $f = P(x) + x^n \varepsilon(x)$ avec P non nul alors f est équivalent à $a_i x^i$ où a_i est le premier coefficient non nul de P (ce coefficient existe forcément car sinon $P = 0$)

Preuve :

soit $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_i x^i + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x)$ avec $a_0 = a_1 = \dots = a_{i-1} = 0$ et $a_i \neq 0$ c'est à dire que $f(x) = a_i x^i + a_{i+1} x^{i+1} + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x)$ alors

$$\frac{f(x)}{a_i x^i} = 1 + \underbrace{\frac{a_{i+1}}{a_i} x + \dots + \frac{a_n}{a_i} x^{n-i} + x^{n-i} \varepsilon(x)}_{\varepsilon_1(x) \rightarrow 0}$$

$$\rightarrow 1$$

donc par définition $f \sim a_i x^i$

les équivalents les plus simples des fonctions usuelles en 0 sont donc :

Fonction	équivalents en 0
e^x	1
$\cos(x)$	1
$\sin(x)$	x
$\frac{1}{1-x}$	1
$\frac{1}{1+x}$	1
$\ln(1+x)$	x
$(1+x)^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}^*$)	1
$\sqrt{1+x}$	1
$\tan(x)$	x

On peut faire la définition analogue pour les suites :

Définition 3 :

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles. On dit que (u_n) est équivalente à (v_n) , et on note $u_n \sim v_n$, si $u_n = v_n + o(v_n)$.

Si v_n ne s'annule pas (ou ne s'annule qu'un nombre fini de fois), cela revient à dire que $\lim \frac{u_n}{v_n} = 1$.

Warning :

Malgré la tentation, ON N'ÉCRIT JAMAIS $f \sim 0$! La seule façon pour que ce soit vrai est en effet que $f(x) = 0$ pour tout x dans un voisinage de a . En général, ce n'est pas ce que vous voulez dire.

Règles de calcul

Pour les équivalents, les choses sont un peu plus compliquées. Les équivalents se comportent bien pour la multiplication :

Proposition 3 : Multiplication

Supposons $f_1 \sim g_1$ et $f_2 \sim g_2$. Alors on a :

- $f_1 f_2 \sim g_1 g_2$.
- Si f_2 et g_2 ne s'annulent pas sur un voisinage de a (mais peuvent s'annuler en a), $\frac{f_1}{f_2} \sim \frac{g_1}{g_2}$.

Mais l'addition et la composition ne marchent pas très bien :

Warning :

On ne peut pas en général additionner des équivalents : Par exemple, si $f_1(x) = -x + x^2$ et $f_2(x) = x$, on a (quand x tend vers 0) $f_1 \sim -x$ et $f_2 \sim x$. Mais on a $f_1 + f_2 \sim x^2$ qui n'est pas équivalent à 0 !

Bonne pratique :

Pour trouver un équivalent de $f_1 + f_2$ en a , on fait un DL en a de $f_1 + f_2$ et on prend le premier coefficient $a_i x^i$ du DL.

► **Exercice 1.** Calculer les limites en 0 de ces fonctions

a) $\frac{\sin(x)(e^{3x} - \cos(x))}{e^{-x} - \sin(-x) + \cos(-x) - 2}$

c) $\frac{\sqrt{1+x}}{2 + \sin(-3x)}$

b) $\frac{\ln(1 + \cos 2x)}{\sqrt{1+x} + e^x}$

d) $\frac{x e^{\cos(x) - \sin(x)}}{\sin(3x)}$

0.0.1 Tangente

Proposition 4 : Multiplication

Soit f une fonction qui admet un DL d'ordre n en 0 : $f(x) = P(x) + x\varepsilon(x)$, $P(x) = \sum a_i x^i$
Alors $y = a_0 + a_1 x$ est l'équation de la tangente en 0. Soit $a_i x^i$ le premier terme non nul du DL plus grand que 1, la position du graphe de f dépend du signe de $a_i x^i$ au voisinage de 0.

— Si $a_i > 0$ et i pair alors f est au dessus de la tangente.

— si $a_i < 0$ et i pair alors f est en dessous de la tangente.

— Si $a_i > 0$ et i impair alors f est au dessus de la tangente pour $x > 0$ et en dessous pour $x < 0$.

— Si $a_i < 0$ et i impair alors f est en dessous de la tangente pour $x > 0$ et au dessus pour $x < 0$.

► **Exercice 2.** Donner les tangentes en 0 et la position relative de f pour les fonctions suivantes

a) e^x

c) $3 + \sin(x)$

b) e^{-x}

d) $4e^x + \cos(2x)$