

1	Quels sont les signes cliniques que peuvent provoquer les fortes doses de méthadone ?	Sédation, arrêt respiratoire	2,5
2	La prise de méthadone a-t-elle été associée à des effets indésirables cardiaques ? Lesquels ?	Oui- allongement du QTc, arythmies graves, torsades de pointes	2,5
3	Le sevrage de méthadone chez le toxicomane substitué est-il possible ? facile ?	oui mais difficile. Les doses de méthadone peuvent aller jusqu'à 100 mg/jour; chez ces patients, le sevrage est très long	2,5
4	Comment l'effectuer ?	la dose doit être progressivement diminuée à 60 mg 1 fois/jour sur plusieurs semaines avant de pouvoir espérer une désintoxication définitive.	2,5
5	Citez quatre signes cliniques classiquement observés lors du syndrome de sevrage des opiacés ?	Anxiété	10
		augmentation de la fréquence respiratoire au repos (> 16/min), transpiration, bâillements, larmolement, rhinorrhée, mydriase et crampes d'estomac.	
		Tremblements musculaires, secousses musculaires, tachycardie, HTA, fièvre et frissons , anorexie, nausées, vomissements et diarrhée.	
6	le sevrage en opiacés peut-il être léthal ?	non	2,5
7	Quels sont les signes cliniques observés à long terme lors du sevrage en méthadone ?	léthargie, sensation de malaise, anxiété et troubles du sommeil peuvent persister jusqu'à plusieurs mois.	10
8	Le besoin irrésistible de drogue peut-il persister pendant des années	Oui	2,5
9	A votre avis, les patients sous traitement substitutif par la méthadone ressentent-ils plus ou moins les douleurs chroniques ?	Plutôt plus	2,5
10	Existe-t-il un traitement spécifique du surdosage en méthadone ?	Oui	2,5
11	par quel mécanisme, ce traitement est actif ?	Effet antagoniste des récepteurs opiacés	2,5
12	pour quels types de produits ingérés, doit-on hospitaliser des patients pour une durée plus importante ?	S'ils ont pris des opiacés à action prolongée, ils doivent être hospitalisés pour mise en observation	2,5
13	dans quelles circonstances peut-on observer un syndrome sérotoninergique ?	prise de fentanyl, mépéridine, tramadol, méthadone, codéine ou d'oxycodone associée à d'autres médicaments qui ont des effets sérotoninergiques	5
14	Citez quatre signes cliniques caractéristiques du syndrome sérotoninergique	Hypertonie, Tremblements et hyperréflexie , Clonus spontané, inductible ou oculaire, Sueurs et instabilité végétative , Agitation, Température > 38° C plus clonus oculaire ou inductible	10