

**université
PARIS-SACLAY**

**FACULTÉ DE
PHARMACIE**


UE 20

**« SANTE PUBLIQUE-EDUCATION EN SANTE
ET GRANDS PROBLEMES DE SANTE »**

Etat de santé de la population française

**Daniel PERDIZ, PharmD, PhD
Santé Publique-Santé Environnementale
UMR-S 1193 INSERM**

Carte des régions de France en 2016




Outils de mesure des indicateurs



- **Statistiques d'état civil** (naissances, décès)
- **Certificats de décès** dans lesquels figurent les causes médicales de décès
- **Registres de pathologies** Recueil continu et exhaustif de données relatives à un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie
- **Maladies à déclaration obligatoire (MDO)**
- **Enquêtes de santé par interview**
- **Enquêtes avec examen de santé**
- **Données médico-administratives** Données de recours au système de soins et de consommation. Différentes sources :
 - ✓ bases de remboursements de soins
 - ✓ base des séjours hospitaliers (diagnostics principal, associés et reliés)
 - ✓ enquêtes spécifiques auprès des prescripteurs
- **CépiDc (INSERM), INSEE**

Indicateurs démographiques

Figure 4. Population de la France - Évaluation provisoire au 1er janvier 2023



Gilles Pison, *Population & Sociétés*, n° 609, mars 2023, INED.

Source : Insee [1, 2].

Population française au 1^{er} janvier 2024

68 373 433 habitants


66 142 961 en France métropolitaine

2 230 472 dans les DROM/COM

(52 % femmes; 48 % hommes)

Populations régionales : 12 millions d'habitants en Île-de-France

Densité de population par région en 2015 (en quartiles)



Hauts de France

Normandie

Grand Est

Île de France

Bretagne

Pays de la Loire

Centre Val de Loire

Bourgogne franche comté

Nouvelle aquitaine

Auvergne Rhône Alpes

Occitanie

PACA

Corse

Guadeloupe

Martinique



Réunion

Mayotte


Guyane

Indicateurs démographiques

Natalité : 80000 naissances en 2015 (723000 en 2022; 678000 en 2023)



© Statista 20
Évolution du nombre de naissances et du taux de natalité pour 1000 habitants en France, entre 1995 et 2015





Note • Résultats provisoires pour le nombre de naissances et les taux 2012, 2013 et 2014.

Champ • France entière (hors Mayotte jusqu'en 2013).

Sources • Estimations de population et statistiques de l'état civil (INSEE).


Indicateurs démographiques

Mortalité : environ 600000 décès en 2015 (673000 en 2022: 639000 en 2023)



© Statista 2022

Évolution du nombre de décès et du taux brut de mortalité depuis 1982



Champ • France entière (hors Mayotte jusqu'en 2013), résultats provisoires en 2013, 2014 et 2015.
Sources • Estimations de population et statistiques de l'état civil (INSEE).

Indicateurs démographiques

Mortalité toutes causes par classe d'âge

Mortalité toutes causes par classe d'âge, année 2016, France métropolitaine

Classe d'âge	Deux sexes		Hommes		Femmes		Sex-ratio (taux)
	Nb	Txstd	Nb	Txstd	Nb	Txstd	
<1 an	2 540	343,0	1 435	379,4	1 105	306,6	1,2
1-14 ans	1 083	10,2	611	11,6	472	8,7	1,3
15-24 ans	2 309	29,5	1 657	41,2	652	17,8	2,3
25-44 ans	12 998	81,7	8 862	112,1	4 136	51,2	2,2
45-64 ans	79 261	471,8	52 708	640,1	26 553	303,5	2,1
65-84 ans	221 020	2 159,8	129 579	2813,9	91 441	1 505,7	1,9
85 ans et +	260 019	13 900,7	94 074	15994,1	165 945	1 1807,3	1,4
Total	579 230	869,7	288 926	1087,8	290 304	651,6	1,7

Nb : nombre de décès ; Txstd : taux standardisé sur la population Eurostat 2012, pour 100 000 habitants.


Indicateurs sanitaires

Mortalité prématurée (évitable et non évitable)

		< 65 ans			< 75 ans		
		Nombre de décès	%	Taux de décès	Nombre de décès	%	Taux de décès
Mortalité prématurée							
Femmes	Métropole	33958	12,3 ¹	128,8	59605	21,6 ¹	215,9
	DROM	1087	22,0 ¹	137,4	1752	35,4 ¹	238,4
	France entière	35046	12,5 ¹	129,1	61357	21,8 ¹	216,5
Hommes	Métropole	69180	24,7 ¹	275,7	117520	42,0 ¹	461,6
	DROM	2167	36,7 ¹	312,8	3261	55,2 ¹	500,3
	France entière	71347	24,9 ¹	276,8	120781	42,2 ¹	462,7
Total	Métropole	103138	18,5 ¹	200,4	177125	31,8 ¹	338,8
	DROM	3254	30,0 ¹	225,1	5013	46,2 ¹	369,3
	France entière	106393	18,8 ¹	203,0	182138	32,1 ¹	339,6

2023 :
Hommes = 226/100000
Femmes = 119/100000

Évolution des taux standardisés* de mortalité prématurée (< 65 ans) et de mortalité évitable



* Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants, selon la population européenne de référence (Revision of the European Standard Population, Eurostat 2013).

Champ • France métropolitaine.

Sources • Certificats de décès (CépiDc); statistiques démographiques (INSEE).


Indicateurs sanitaires

Mortalité évitable par une prévention primaire

Libellés
Sida et infection par le VIH
Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx
Tumeur maligne de l'œsophage
Tumeur maligne du larynx
Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon
Psychose alcoolique et alcoolisme
Cirrhose alcoolique ou sans précision du foie
Accidents de la circulation
Chutes accidentelles
Suicides
Séquelles de suicides

< 65 ans		
Nombre de décès	%	Taux de décès

Mortalité évitable				
Femmes	Métropole	7 573	22,3 ²	29,0
	DROM	127	11,7 ²	16,3
	France entière	7 701	22,0 ²	28,7
Hommes	Métropole	23 692	34,2 ²	95,1
	DROM	570	26,3 ²	83,6
	France entière	24 262	34,0 ²	94,8
Total	Métropole	31 265	30,3 ²	61,2
	DROM	697	21,4 ²	50,0
	France entière	31 963	30,0 ²	61,7



Indicateurs sanitaires

Causes de mortalités (tout âges confondus)

Catégorie	Deux sexes		
	Nb	%	Txstd
Maladies infectieuses et parasitaires	10 177	1,8%	15,1
Sida et VIH	303	0,1%	0,5
Tumeurs	168 064	29,0%	268,1
– VADS (Cancer des voies aérodigestives supérieures)	8 714	1,5%	14,4
– Estomac, foie, pancréas, côlon, rectum, anus	41 843	7,2%	66,3
Côlon, rectum, anus	17 716	3,1%	27,5
Pancréas	11 089	1,9%	17,3
– Poumons, bronches, trachée	31 526	5,4%	52,4
– Mélanome	1 732	0,3%	2,8
– Sein, utérus, ovaire	19 626	3,4%	26,5
Sein	12 669	2,2%	17,0
– Prostate	8 721	1,5%	17,0
– Reins et vessie	8 860	1,5%	14,9
– Cerveau et système nerveux central	3 907	0,7%	6,3
– Hémopathies malignes	14 040	2,4%	22,2
– Autres tumeurs	29 095	5,0%	45,4
Diabète	11 275	1,9%	16,9

Catégorie	Deux sexes		
	Nb	%	Txstd
Démences	40 336	7,0%	52,2
Parkinson	6 526	1,1%	10,2
Maladies cardiovasculaires	140 424	24,2%	204,4
– Cardiopathies ischémiques	32 460	5,6%	50,7
– Maladies cérébrovasculaires	31 228	5,4%	44,5
Maladies respiratoires chroniques	11 156	1,9%	17,7
Maladies chroniques du foie	6 742	1,2%	11,1
Maladies du rein et de l'uretère	7 413	1,3%	11,0
Mort subite de l'adulte	1 782	0,3%	2,7
Cause inconnue	24 589	4,2%	36,8
Accidents	26 681	4,6%	40,1
– Accidents de transport	3 031	0,5%	4,8
– Chutes accidentelles	7 655	1,3%	11,3
Suicide	8 435	1,5%	14,0
Autres causes	115 630	20,0%	169,4
Toutes causes	579 230	100,0%	869,7

Indicateurs sanitaires

Variation annuelle moyenne du taux de mortalité sur les périodes 2000-2007 et 2008-2016, hommes *versus* femmes.

Classification	Hommes		Classification	Femmes	
	2000-2007	2008-2016		2000-2007	2008-2016
Maladies infectieuses et parasitaires	- 3,0%	- 4,1%	Maladies infectieuses et parasitaires	- 3,0%	- 3,0%
Sida et VIH	- 5,9%	- 7,4%	SIDA et VIH	↔	- 8,1%
Tumeurs	- 1,7%	- 1,5%	Tumeurs	- 1,0%	↔
VADS (Cancers des voies aérodigestives supérieures)	- 4,3%	- 2,1%	VADS (Cancers des voies aérodigestives supérieures)	- 1,5%	↔
Estomac, foie, pancréas, côlon, rectum, anus	- 1,6%	- 1,5%	Estomac, foie, pancréas, côlon, rectum, anus	- 1,8%	- 1,6%
Côlon, rectum, anus ¹	- 1,7%	- 1,6%	Côlon, rectum, anus ¹	- 1,6%	- 1,7%
Pancréas ¹	+0,8%	+0,8%	Pancréas ¹	+1,4%	+1,9%
Poumon, bronches, trachée	- 0,9%	- 1,7%	Poumon, bronches, trachée ¹	+4,5%	+2,8%
Mélanome	↔	- 1,1%	Mélanome ¹	↔	↔
Sein ¹	+3,2%	+7,2%	Sein, utérus, ovaires	- 1,1%	↔
Prostate	- 2,8%	- 3,0%	Sein	- 1,2%	↔
Reins et vessie	- 0,9%	- 1,0%	Reins et vessie	- 1,2%	↔
Cerveau et système nerveux central	- 1,3%	+0,8%	Cerveau et système nerveux central	- 1,6%	+1,5%
Hémopathies malignes	- 1,7%	- 0,9%	Hémopathies malignes	- 2,3%	↔
Autres tumeurs	- 2,3%	- 2,1%	Autres tumeurs	- 2,4%	- 1,1%
Diabète	- 1,9%	- 2,0%	Diabète	- 2,3%	- 2,0%
Démences¹	+0,8%	↔	Démences¹	+1,5%	+1,1%
Maladie de Parkinson¹	- 1,1%	+2,0%	Maladie de Parkinson¹	- 1,6%	+1,5%
Maladies cardiovasculaires	- 3,8%	- 3,2%	Maladies cardiovasculaires	- 3,6%	- 3,0%
Cardiopathies ischémiques	- 4,5%	- 3,6%	Cardiopathies ischémiques	- 4,7%	- 4,9%
Maladies cérébrovasculaires	- 4,8%	- 3,9%	Maladies cérébrovasculaires	- 4,9%	- 3,0%
Maladies respiratoires chroniques	- 2,9%	- 1,3%	Maladies respiratoires chroniques	- 2,3%	+1,3%
Maladies chroniques du foie^{1,2}	- 3,7%	- 2,3%	Maladies chroniques du foie¹	- 3,7%	- 3,4%
Maladies du rein et de l'uretère	↔	↔	Maladies du rein et de l'uretère	↔	+1,7%
Mort subite adulte	↔	- 1,7%	Mort subite de l'adulte	- 2,5%	- 2,0%
Accidents	- 4,0%	↔	Accidents	- 4,8%	- 0,5%
Accidents de transport	- 7,7%	- 6,0%	Accidents de transport	- 9,7%	- 5,0%
Chutes accidentelles	- 1,7%	+1,5%	Chutes accidentelles	- 2,2%	+1,6%
Suicides¹	- 1,8%	- 3,3%	Suicides	- 1,7%	- 4,6%
Autres causes	- 1,9%	↔	Autres causes	- 2,8%	- 0,7%

Indicateurs sanitaires

Etat de Santé perçu par la population

État de santé perçu selon le sexe en 2014* (en %)


État de santé général	Ensemble	Hommes	Femmes
Très bon	23,6	25,7	21,5
Bon	44,6	45,2	44,0
Assez bon	23,5	21,6	25,2
Mauvais	7,2	6,3	7,9
Très mauvais	1,2	1,1	1,3

* Libellé de la question : « Comment est votre état de santé en général? »

Champ • France métropolitaine, population vivant en ménage ordinaire, âgée de 16 ans ou plus.

Source • Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV-SILC (Eurostat 2014).

État de santé perçu selon l'âge et le sexe en 2014* (en %)




* Libellé de la question : « Comment est votre état de santé en général? »

Champ • France métropolitaine, population vivant en ménage ordinaire, âgée de 16 ans ou plus.

Source • Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV-SILC (Eurostat 2014).

Indicateurs sanitaires

Répartition des personnes déclarant une « maladie chronique » selon le sexe et l'âge, en 2014 (en %)



* Libellé de la question : « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? »

Champ • France métropolitaine, population vivant en ménage ordinaire, âgée de 16 ans ou plus.

Source • Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV-SILC (Eurostat 2014).

Indicateurs sanitaires

Déclaration de limitation d'activité depuis au moins six mois selon le sexe, en 2015 (en %)


Limitation d'activité	Ensemble	Femmes	Hommes
Oui, fortement limité(e)	8,7	9,4	8,0
Oui, limité(e), mais pas fortement	16,5	17,3	15,6
Non, pas limité(e) du tout	74,8	73,3	76,5

* Libellé de la question : « Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité(e) dans les activités que font les gens habituellement ? »

Champ • France métropolitaine, population vivant en ménage ordinaire, âgée de 16 ans ou plus.

Source • Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV-SILC (Eurostat 2015).

Répartition des personnes déclarant une limitation d'activité* depuis au moins six mois selon l'âge et le sexe, en 2015* (en %)



* Libellé de la question : « Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité(e) dans les activités que font les gens habituellement ? »

Champ • France métropolitaine, population vivant en ménage ordinaire, âgée de 16 ans ou plus.

Source • Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV-SILC (Eurostat 2015).

Indicateurs sanitaires

Comparaison de l'état de santé déclaré en Europe en 2014

	Santé perçue (%)			Maladie chronique (%)	Limitation d'activité				Santé perçue (%)			Maladie chronique (%)	Limitation d'activité			
	Bonne ou très bonne	Assez bonne	Mauvaise ou très mauvaise		Non	Oui, limité(e)	Oui, très limité(e)		Bonne ou très bonne	Assez bonne	Mauvaise ou très mauvaise		Non	Oui, limité(e)	Oui, très limité(e)	
Autriche	69,5	21,6	8,9	35,8	66,9	23,3	9,8									
Belgique	75,0	15,8	9,2	24,9	76,0	14,6	9,5	Italie	67,9	20,0	12	24,8	71,0	20,0	9,0	
Bulgarie	65,7	22,1	12,1	20,5	81,9	14,1	4,0	Lettonie	45,8	37,1	17,1	40,6	62,6	27,8	9,6	
Croatie	57,9	22,1	20,0	30,9	70,9	21,5	7,6	Lituanie	44,9	37,2	17,9	32,3	74,1	18,3	7,6	
Chypre	77,5	17,0	5,5	32,3	81,6	11,1	7,3	Luxembourg	72,8	18,9	8,3	22,7	76,1	16,1	7,8	
Rép. tchèque**	60,7	27,7	11,6	31,7	76,3	17,5	6,2	Malte	74,7	22,0	3,3	28,2	89,8	7,4	2,8	
Danemark	72,4	20,2	7,4	28,1	72,0	21,9	6,1	Pays-Bas	77,3	17,2	5,4	34,7	71,6	22,9	5,5	
Estonie**	51,8	31,7	16,5	45,9	65,8	24,4	9,8	Norvège	78,5	14,6	6,9	33,1	84,3	10,9	4,8	
Finlande	69,2	24,4	6,4	46,1	67,3	25,1	7,6	Pologne	58,1	28,1	13,7	34,0	75,7	16,7	7,6	
France	68,1	23,5	8,4	37,1	75,0	15,7	9,2	Portugal	45,9	35,7	18,3	40,4	64,8	26,0	9,2	
Allemagne	65,2	26,8	8,0	38,8	63,8	25,5	10,7	Roumanie	70,8	20,4	8,7	18,9	74,7	17,7	7,6	
Grèce	73,5	15,8	10,8	24,1	75,8	12,7	11,4	Slovaquie	64,7	22,6	12,7	30,3	68,0	22,1	9,9	
Hongrie	57,5	26,7	15,9	37,1	73,8	18,6	7,6	Slovénie	64,8	24,2	11,0	32,3	70,1	20,6	9,3	
Islande	76,1	17,5	6,3	30,6	82,1	7,8	10,1	Espagne	72,6	19,1	8,3	29,8	76,2	18,4	5,4	
Irlande	82,5	13,5	4,0	27,1	82,2	11,9	5,8	Suède	80,1	15,9	4,0	34,9	88,3	8,5	3,2	
								Suisse	79,3	16,9	3,8	36,2	69,9	25,3	4,7	
								Royaume-Uni	70,0	21,0	9,0	34,3	77,1	12,6	10,4	

* À partir des trois questions sur la santé perçue du mini-module européen.



** Peu fiable.

Champ • 31 pays d'Europe, population vivant en ménage ordinaire, âgée de 16 ans ou plus.

Source • Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV-SILC (Eurostat 2014).

Inégalités sociales et spatiales de santé

- Disparités sociales significatives en matière de santé
- Déterminants supposés
 - ✓ Socio-économique et environnementaux
 - ✓ Comportementaux
 - ✓ Système de santé
 - ✓ Politiques sanitaires
- Indicateurs sanitaires
 - ✓ Santé perçue, fonctionnelle, maladies chroniques
 - ✓ Espérance de vie à 35 ans avec ou sans incapacités
 - ✓ Accès aux soins
- Indicateurs démographiques
 - ✓ Population
 - ✓ Mortalité
- Indicateurs sociaux
 - ✓ 8 catégories socio-professionnelle
 - ✓ 4 niveaux d'étude



CORRESPONDANCE ENTRE LES GROUPES ET LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

Niveau agrégé (8 postes dont 6 pour les actifs)	Niveau de publication courante (24 postes dont 19 pour les actifs)	Niveau détaillé (42 postes dont 32 pour les actifs)
1 Agriculteurs exploitants	10 Agriculteurs exploitants	11 Agriculteurs sur petite exploitation 12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 13 Agriculteurs sur grande exploitation
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	21 Artisans	21 Artisans
	22 Commerçants et assimilés	22 Commerçants et assimilés
	23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures	31 Professions libérales et assimilés	31 Professions libérales
	32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et Artistiques	33 Cadres de la fonction publique 34 Professeurs, professions scientifiques 35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
4 Professions Intermédiaires	36 Cadres d'entreprise	37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
	41 Professions Intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés	42 Professeurs des écoles, Instituteurs et assimilés 43 Professions Intermédiaires de la santé et du travail social
	46 Professions Intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	44 Clergé, religieux 45 Professions Intermédiaires administratives de la fonction publique
	47 Techniciens	46 Professions Intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
	48 Contremaîtres, agents de maîtrise	47 Techniciens
	5 Employés	51 Employés de la fonction publique
54 Employés administratifs d'entreprise		52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 53 Policiers et militaires
55 Employés de commerce		54 Employés administratifs d'entreprise
56 Personnels des services directs aux particuliers		55 Employés de commerce
61 Ouvriers qualifiés		56 Personnels des services directs aux Particuliers
6 Ouvriers	66 Ouvriers non qualifiés	62 Ouvriers qualifiés de type Industriel 63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 64 Chauffeurs 65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du Magasinage et du transport
	69 Ouvriers agricoles	67 Ouvriers non qualifiés de type Industriel 68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
	71 Anciens agriculteurs exploitants	69 Ouvriers agricoles
7 Retraités	72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise	71 Anciens agriculteurs exploitants
	73 Anciens cadres et professions Intermédiaires	72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
	76 Anciens employés et ouvriers	74 Anciens cadres 75 Anciennes professions Intermédiaires
	81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé	77 Anciens employés 78 Anciens ouvriers
8 Autres personnes sans activité professionnelle	82 Inactifs divers (autres que retraités)	81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
		83 Militaires du contingent 84 Elèves, étudiants 85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

Inégalités de santé et catégories socio-professionnelles

- Indicateurs sanitaires

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon la profession et catégorie socioprofessionnelle (en pourcentage)

	Part de la population déclarant...			Part dans la population totale
	être au moins en assez bonne santé ^a	avoir un problème de santé chronique ^b	avoir une limitation d'activité ^c	
Agriculteurs exploitants	96,1	21,0	11,8	1,3
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	97,1	22,1	13,7	3,3
Cadres et professions intellectuelles supérieures	98,1	20,6	8,8	7,6
Professions intermédiaires	97,8	23,0	10,3	13,3
Employés	95,4	25,8	14,1	17,4
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles)	94,2	25,1	15,6	13,8
Retraités	80,0	59,3	43,4	29,1
Autres inactifs	90,3	26,4	20,3	14,2
Total	90,4	34,5	22,7	100,0

a. Libellé de la question : « Comment est votre état de santé en général ? Très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais. »
b. Libellé de la question : « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? »
c. Libellé de la question : « Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité(e) dans les activités que font les gens habituellement ? »
Champ : Personnes âgées de plus de 15 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.
Sources : Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2007, Insee.

Un gradient social marqué.....

Inégalités de santé et catégories socio-professionnelles

- Indicateurs sanitaires

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon le niveau d'études (en pourcentage)

Niveau de diplôme	Part de la population déclarant...			Part dans la population totale
	être au moins en assez bonne santé ^a	avoir un problème de santé chronique ^b	avoir une limitation d'activité ^c	
Sans diplôme ou CEP	80,5	50,4	40,2	30,3
CAP – BEPC	92,5	31,0	18,8	9,7
BAC – BAC + 2	93,9	28,9	16,3	38,8
Diplôme supérieur	97,3	23,6	11,3	21,2
Total	90,4	34,5	22,7	100

a. Libellé de la question : « Comment est votre état de santé en général ? Très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais. »
b. Libellé de la question : « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? »
c. Libellé de la question : « Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité(e) dans les activités que font les gens habituellement ? »
Champ : Personnes âgées de plus de 15 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.
Sources : Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2007, Insee.

.....à relier au niveau d'études

Inégalités de santé et catégories socio-professionnelles

- Indicateurs sanitaires

Espérance de vie à 35 ans : des écarts qui se creusent entre les cadres et les ouvriers et plus importants chez les hommes que chez les femmes

Espérance de vie des hommes et des femmes à 35 ans, par période et catégorie socio-professionnelle (en années)


	Cadres et professions intellectuelles supérieures	Professions intermédiaires	Agriculteurs	Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	Employés	Ouvriers	Inactifs non retraités	Ensemble
Hommes								
1976-1984	41,5	40,5	40,5	39,5	37,0	35,5	27,5	38,0
1983-1991	43,5	41,5	41,5	41,0	38,5	37,5	27,5	39,0
1991-1999	46,0	43,0	43,5	43,0	40,0	39,0	28,5	41,0
Femmes								
1976-1984	47,5	46,5	45,5	46,0	45,5	44,5	44,5	45,0
1983-1991	49,5	48,0	47,0	47,5	47,5	46,5	45,5	46,5
1991-1999	50,0	49,5	48,5	49,0	48,5	47,0	47,0	48,0

Champ : France entière.

Sources : Insee, échantillon démographique permanent et état civil.

Espérance de vie à 35 ans avec et sans incapacité (cadres vs ouvriers) : des inégalités

Espérance de vie à 35 ans selon trois indicateurs d'incapacité chez les cadres supérieurs et les ouvriers, en 2003



Champ : France métropolitaine.

Sources : Calculs des auteurs (Cambois et al.) d'après les données de l'Échantillon démographique permanent et de l'Enquête sur la santé et les soins médicaux 2002-2003.

Inégalités de santé et catégories socio-professionnelles

- Espérance de vie à 35 ans avec et sans incapacité

Espérance de vie à 35 ans sans incapacité (toutes CSP)

Espérance de vie selon le sexe, l'incapacité et la catégorie socio-professionnelle, en 2003

	EV en années	Indicateurs d'incapacité					
		Difficultés dans les activités de soins personnels		Difficultés dans les activités en général		Problèmes fonctionnels physiques et sensoriels	
		EV en années	EVSI/EV	EV en années	EVSI/EV	EV en années	EVSI/EV
Hommes							
Espérance de vie à 35 ans							
Cadres supérieurs	46,6	2,1	95,5 %	7,0	84,9 %	12,6	72,9 %
Professions intermédiaires	44,8	2,4	94,8 %	7,9	82,4 %	14,0	68,8 %
Agriculteurs exploitants	45,3	2,9	93,5 %	8,2	81,8 %	16,3	64,0 %
Indépendants	44,4	2,5	94,3 %	7,4	83,4 %	14,3	67,8 %
Employés	42,1	3,1	92,7 %	8,1	80,8 %	13,7	67,4 %
Ouvriers	40,9	3,4	91,7 %	9,1	77,8 %	16,5	59,8 %
Inactifs	30,4	8,7	71,2 %	20,4	32,8 %	19,9	34,6 %
Total	42,8	3,0	92,9 %	8,7	79,6 %	15,1	64,7 %
Écart cadres-ouvriers	5,7	-1,3	3,8 %	-2,0	7,1 %	-3,9	13,2 %

Femmes							
Espérance de vie à 35 ans							
Cadres supérieures	50,9	4,4	91,3 %	9,9	80,6 %	15,5	69,6 %
Professions intermédiaires	49,8	4,4	91,1 %	11,4	77,2 %	17,7	64,5 %
Agricultrices exploitantes	50,1	6,2	87,6 %	12,3	75,5 %	20,7	58,7 %
Indépendantes	50,1	5,3	89,5 %	11,4	77,3 %	18,4	63,2 %
Employées	49,4	5,0	90,0 %	11,2	77,2 %	20,5	58,5 %
Ouvrières	48,6	6,1	87,5 %	13,2	72,8 %	21,8	55,2 %
Inactives	46,7	5,6	88,0 %	13,9	70,3 %	21,2	54,6 %
Total	48,8	5,3	89,2 %	12,1	75,2 %	20,0	59,0 %
Écart cadres-ouvrières	2,3	-1,6	3,7 %	-3,3	7,7 %	-6,3	14,4 %

Inégalités de santé et catégories socio-professionnelles

- Indicateurs d'accès aux soins : renoncement d'accès aux soins

15% de la population adulte métropolitaine a renoncé à des soins pour des raisons financières

47% la santé bucco-dentaire
18% les lunettes
12% les soins de spécialistes

18% des femmes ont renoncé à des soins, 12% des hommes

Facteur principal du renoncement : absence de couverture complémentaire (29% des personnes non couvertes pour 15% des personnes couvertes)

Plus le revenu est faible plus le renoncement est élevé

Les ménages d'employés de commerce, d'employés administratifs et d'ouvriers sont ceux qui déclarent le plus renoncer à des soins (respectivement 24%, 18% et 17%)




Inégalités de santé et territoire

► 6. Pyramide des âges au 1^{er} janvier 2021

- Indicateurs démographiques

Population française : 66,6 millions d'habitants (1^{er} janvier 2016)
67,4 millions en 2021



Populations régionales : 12 millions d'habitants en Île-de-France

Hauts de France

Normandie

Grand Est

Île de France

Bretagne

Pays de la Loire

Centre Val de Loire

Bourgogne franche comté

Nouvelle aquitaine

Auvergne Rhône Alpes

Occitanie

PACA

Corse

Guadeloupe


Martinique

Réunion

Mayotte

Guyane

Densité de population par région en 2015 (en quartiles)



Inégalités de santé et territoire

- Indicateurs démographiques

Répartition par âge : 24,6% de moins de 20 ans et 9,1% de 75 ans ou plus


Population totale par sexe et grandes classes d'âges au 1^{er} janvier 2016

	Ensemble		Hommes		Femmes	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
0-14 ans	12 320 073	18,5	6 304 791	19,5	6 015 282	17,5
15-24 ans	7 840 953	11,8	3 988 162	12,4	3 852 779	11,2
25-44 ans	16 652 950	25,0	8 219 564	25,5	8 433 361	24,6
45-64 ans	17 293 472	26,0	8 429 816	26,1	8 863 630	25,8
65-84 ans	10 503 301	15,8	4 718 023	14,6	5 785 263	16,8
85 ans ou plus	2 016 933	3,0	630 931	2,0	1 386 000	4,0
Ensemble	66 627 682	100,0	32 291 287	100,0	34 336 315	100,0

Champ • France entière.

Sources • Estimations de population (résultats provisoires arrêtés au 1^{er} janvier 2016) (INSEE).

Proportion des 65 ans et + selon les régions



Note • Chaque quintile comprend un cinquième des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

Champ • France entière (hors Mayotte en 1995).

Sources • Estimations de population et recensement (INSEE).

Inégalités de santé et territoire

Mortalité générale

Mortalité Infantile

Évolution du taux de mortalité standardisé* en France et en Europe


Année	France		Union européenne (28 pays)	
	Masculin	Féminin	Masculin	Féminin
2000	14,7	8,4	-	-
2001	14,5	8,2	-	-
2002	14,3	8,2	15,9	10,2
2003	14,4	8,5	15,9	10,4
2004	13,2	7,5	15,2	9,8
2005	13,3	7,6	15,0	9,8
2006	12,8	7,2	14,2	9,3
2007	12,6	7,1	14,0	9,1
2008	12,5	7,2	13,7	9,0
2009	12,3	7,1	13,5	8,8
2010	12,1	6,9	13,2	8,6
2011	11,6	6,7	12,8	8,4
2012	11,7	6,9	12,8	8,5
2013	11,4	6,7	12,7	8,4

* Taux standardisés sur l'âge pour 1 000 habitants, selon la population européenne de référence (Revision of the European population, Eurostat 2013).


Champ • France entière; Union européenne (28 pays).

Source • Eurostat.

Taux brut de mortalité (/1000 hab) en 2011




Taux de mortalité infantile en 2014



Champ • Union européenne (28 pays).

Source • Eurostat.

Taux de mortalité infantile (/1000 naissances) en 2009




Evolution de la mortalité infantile en France depuis 1901



Inégalités de santé et territoire

Mortalité prématurée et territoire

Écarts régionaux des taux standardisés* de mortalité prématurée (< 65 ans), en 2013




* Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants, selon la population européenne de référence (Revision of the European Standard Population, Eurostat 2013).

Champ • France métropolitaine.

Sources • Certificats de décès (CépiDc); statistiques démographiques (INSEE).

Mortalité évitable et territoire

Écarts régionaux des taux standardisés* de mortalité évitable, en 2011-2013



* Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants, selon la population européenne de référence (Revision of the European Standard Population, Eurostat 2013).


Champ • France métropolitaine.

Sources • Certificats de décès (CépiDc); statistiques démographiques (INSEE).

Causes de mortalité « évitable » retenues et codes CIM (Classification internationale des maladies) correspondants

Codes CIM-10	Libelles
B20-B24	Sida et infection par le VIH
C00-C14	Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx
C15	Tumeur maligne de l'œsophage
	Tumeur maligne du larynx
C32-C34	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon
F10	Psychose alcoolique et alcoolisme
K70, K74.6	Cirrhose alcoolique ou sans précision du foie
V01-V89	Accidents de la circulation
W00-W19	Chutes accidentelles
X60-X84	Suicides
Y87.0	Séquelles de suicides

Inégalités sociales et spatiales de santé




La classification a permis d'identifier sept classes regroupant des cantons au profil socio-sanitaire similaire :

- classe 1 : zones urbanisées, socialement favorisées, à proximité des services de soins, en sous-mortalité ;
- classe 2 : zones plutôt péri-urbaines, en situation moyenne par rapport au niveau national, tant pour la situation sociale que pour la mortalité, relativement peu dotées en services de soins de premier recours libéraux ;
- classe 3 : zones relativement peuplées, avec une offre de soins de premier recours libérale importante, dans la moyenne nationale en regard de la mortalité, marquées par des différences sociales importantes entre les diverses populations qui la constituent ;
- classe 4 : zones rurales avec de fortes proportions d'agriculteurs exploitants et de personnes âgées, connaissant une certaine précarité, éloignées des services de soins, en sous-mortalités générale et prématurée, hormis pour les causes accidentelles ;
- classe 5 : zones rurales, avec des proportions d'ouvriers et d'agriculteurs exploitants élevées, de faibles densités de professionnels de santé, en surmortalités générale, prématurée et accidentelle au sens large ;
- classe 6 : zones industrielles avec une proportion d'ouvriers importante, des situations de précarité fréquentes, en surmortalités générale et prématurée ;
- classe 7 : zones avec une population jeune, une fécondité élevée, socialement défavorisées, en surmortalité par maladies vasculaires cérébrales et en sous-mortalité par cancers.

Source : cette carte est extraite de l'ouvrage *Inégalités socio-sanitaires en France, de la région au canton* publiée dans la collection *Abrégés* chez Elsevier-Masson, exploitation Frois.

Des déterminants multiples, qui s'accumulent et qui s'enchaînent

Les inégalités sociales de santé se construisent dès l'enfance et même avant



Trois grandes familles de déterminants de l'état de santé :

- les facteurs socio-économiques et environnementaux
Education, revenu, conditions de vie dans l'enfance, accès à l'emploi, conditions de travail, conditions de vie et environnement, intégration sociale...
- les comportements
- le système de soins



Les déterminants qui favorisent un bon état de santé, dont l'inégale répartition sociale contribue aux inégalités sociales de santé

DES FACTEURS DE PROTECTION

Les facteurs qui favorisent un bon état de santé, dont l'inégale répartition sociale contribue aux inégalités sociales de santé

- Naître dans de bonnes conditions
- Avoir accès à l'éducation
- Disposer de liens familiaux et sociaux solides
- Percevoir et disposer effectivement d'un contrôle sur sa vie
- Vivre dans un environnement social et physique sain
- Travailler dans de bonnes conditions
- Adopter un style de vie favorable à la santé
- Avoir un accès effectif à des soins de qualité

