


ANGOR STABLE STRATEGIE THERAPEUTIQUE

❖ Les dérivés nitrés :



En fonction de la formulation galénique



Effets indésirables :

- Maux de têtes, bouffées de chaleur
- Hypotensions sévères
- Tachycardie réflexe

Indications :

- En association +++ avec
 - Les β –bloquants (tachycardie réactionnelle)
 - Et/ou inhibiteurs calciques

❖ Les antagonistes des récepteurs β adrénergiques:



sans ASI ou ASI faible

Faible ASI : acébutolol ; céliprolol (agoniste beta2 vasodilatateur)

Sans ASI : Aténolol, métoprolol, bétaxolol, bisoprolol, propranolol



Débuter le traitement à faible dose
Pas d'arrêt brutal (1 à 2 semaines)



❖ Les inhibiteurs calciques :

Verapamil / diltiazem

Bradycardisants
=> ↓ besoins en O₂
=> ↑ apports en O₂

Dihydropyridines

↓ des résistances vasculaires systémiques
=> ↓ besoins en O₂

Dihydropyridines à action courte
=> **tachycardie** (associer à β bloquant)
=> **œdèmes** des chevilles, céphalées...



Indications :

- CI des β -bloquants (diltiazem)
- bradycardie (Amlodipine)
- En association avec nitrés et β –bloquants (si inefficacité du ttt)
- En cas d'angor mixte ou à forte composante spastique (Prinzmetal)

❖ Autres:

Molsidomine :

- Action voisine des dérivés nitrés sans phénomène d'échappement
- Indiquée en traitement de fond
- Ne pas associer à des nitrés

Nicorandil :

- Active l'ouverture des canaux K⁺ : vasodilatation artérielle: ↓ post-charge
- Activateur de la guanylate cyclase : veinodilatateur : ↓ pré-charge
- Efficace chez des patients résistants au traitement de fond par dérivés nitrés



❖ Aspirine :

La prévention de la thrombose est indispensable

Prévention
antithrombotique

Antiagrégants
plaquettaires


Aspirine

Acétyle la cyclooxygénase => inhibition de la synthèse plaquettaire du thromboxane A2

=> **Effet antiagrégant plaquettaire**

75 à 160 mg/j en absence de contre-indication

Si CI à l'aspirine : **Clopidogrel (75 mg/j)**




❖ Statines :


La prévention de la rupture de la plaque est indispensable

Statines en systématique.
Objectif : LDL cholestérol < 1 g/L

Stratégie thérapeutique de l'angor stable



Stratégie thérapeutique de l'angor stable : synthèse



ANGOR STABLE STRATEGIE THERAPEUTIQUE