Docteur OD

Médecin généraliste

Adresse

92220 Bagneux

RPPS :

Madame LM (87 ans)

01/10/20XX

Bisoprolol 2.5 mg: 1 matin et soir

Amlor (amlodipine) 10 mg: 1 le matin

Lasilix (Furosémide) 40 mg : 1 le matin

Kaléorid (chlorure de potassium) 600 mg cp : 2/j

Lantus (insuline Glargine) : 14 unités le soir

Coumadine (warfarine) 2 mg: 1 le soir

Imovane (Zopiclone) 3,75 mg: 1 au coucher

Docteur LM Généraliste Boulevard XXX

75 015 Paris RPPS :.....

Madame P (91 ans)

20/1020XX

Tanakan (Ginkgo biloba) 40 mg cpr: 1-1-1

Imovane (Zopiclone) 7,5 mg cpr : 1 le soir

Chondrosulf (chondroïtine sulfate sodique) 400 mg gelule : 1-1-1

Eliquis (apixaban) 2,5 mg cp: 1-0-1

Digoxine 0.25 mg cp : 1-0-0

Pantoprazole 20 mg cpr: 1-0-0

Atarax 25 mg cp : ½ cp si anxiété

Lercanidipine 10 mg cpr: 1-0-0

Traitement pour 1 mois

Signature

Docteur MP Médecine Générale 15 Av.... Monsieur V (90 ans)

15/06/17

FUROSEMIDE 20 MG CP: 1 cp le matin CELIPROLOL 200 MG CPR: 1 cp matin

MIANSERINE 30 MG CP: 1/j

LYSANXIA 10MG CPR: 1 cp matin midi et soir


LOXEN LP 50MG GELULE: 2 par jour

ZOLPIDEM BGA 10MG CPR: 1 cp au coucher

COTAREG 160MG/25MG CPR: 1/j

Traitement pour 3 mois

Signature



Consuftation lundi et mercredi de 9H30 à 13H Mardi de 15h à 19H30 lundi et vendredi de 16h à 19H Jeudi de 9h30 à 12H et de

Acheres, le 22/11/2019







Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)

(AFFECTION EXONÉRANTE)

MICARDISPLUS 80/12,5MG CPR 30X1

1 comprimé le matin

LERCANIDIPINE 10MG ARW CPR SEC 30

1 comprimé le matin

ALDACTAZINE CPR SECABLE 30

1 comprimé le matin

FLECAINE LP 100MG GELULE 30

1 gélule le matin

PRADAXA 110MG GELULE 60X1

1 gélule le matin et le soir

@5P

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée (MALADIES INTERCURRENTES)

CETIRIZINE 10 MG CPR

un comprime le soir pendant deux semaines

LANSOPRAZOLE 30MG EVOL GELULE 28

1 gélule le soir


BROMAZEPAM 6MG CPR QUADRISECABLE 30


Un demi comprimé au coucher

Nombre o

Nombre de produits : 8

Membre d'une association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté.





le Jeudi 5 Septembre 2019

TRAITEMENT pour 3 Mois


Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste où hors (AFFECTION EXONERANTE)	
EUPRESSYL 60MG GELULE FL 30 (Urapidil) 1 gélule le matin et le soir à la place d'alpress (prazosine)	3 Mois
Diltiazem chlorhydrate 300 mg gélule LP 1 gélule le matin	3 Mois 3 Mois
Ezétimibe 10 mg comprimé	3 Mois
Pravastatine sodique 20 mg comprimé	3 Mois
Rilménidine 1 mg comprimé I comprimé le matin et le soir	3 Mois
COAPROVEL 300MG/25MG CPR 90 (Irbésartan + hydrochlorothiazide)	<u> </u>
l comprimé par Jeur Répaglinide 2 mg comprimé 1 comprimé le matin, le midi et le soir, avant le repas	3 Mois
KARDEGIC 75MG SACHET 30 (Acide acétylsalicylique) 1 sachet le soir	QSP
Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée (MALADIES INTERCURRENTES)	
Alprazolam 0,50 mg comprimé	3 Mois
Fluticasone propionate 500 microgrammes/dose poudre pou 2 doses le matin et le soir Se rincer la bouche après chaque utilisation.	3 Mois
TRANSIPEG 5,9G SACHET 20 (Macrogol)	3 Mois
1 sachet le midi et le soir ZOPICLONE 7,5MG ALTER CPR SECAB 14 (Zopiclone)	1 Mois
1 comprimé au coucher VENTOLINE 100MCG/DOSE INHAL 200 (Salbutamol) 2 bouffées le matin, le midi et le soir	QSP
2 bouries to mann, it may	>



S 3321 AP

ORIGINAL à conserver par le patient

17



- Faible autonomie aggravée par une surdité handicapante.
- Mme P. ne comprend pas l'utilité des spécialités qui lui sont prescrites et se plaint d'un trop grand nombre de médicaments à prendre. Il lui arrive également d'oublier de prendre son traitement. (score de Girerd à 2), et nous craignons que sa non-observance ne la conduise à un échappement thérapeutique.
- Mme P. mentionne également de nombreux **effets indésirables** (sécheresse buccale et douleurs musculaires) qui sont à l'origine de son **inobservance.**
- Elle présente une **dyspnée marquée**, survenant au cours de la marche et des activités quotidiennes de faible intensité