
Feuille d'exercices 5

Nombres complexes

Exercice 5.1. Fractions

Écrire sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

$$z_1 = \frac{3+6i}{3-4i}, z_2 = \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2, z_3 = \frac{2+5i}{1-i} + \frac{2-5i}{1+i}.$$

Exercice 5.2. Forme algébrique

Écrire sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

$$z_1 = 2e^{2i\pi/3}, z_2 = (2e^{i\pi/4})(e^{-3i\pi/4}).$$

Exercice 5.3. Forme trigonométrique

1. Écrire sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants (on pourra utiliser les valeurs connues de cosinus et de sinus sans les justifier) : $z_1 = 1 + i$, $z_2 = \sqrt{3} - i$.

2. Écrire $z_1 z_2$ sous forme algébrique et sous forme trigonométrique. En déduire les valeurs de $\cos(\pi/12)$ et de $\sin(\pi/12)$.

Exercice 5.4. Formules d'Euler

1. Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$ et $\operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$.

2. En déduire, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, une expression de $\cos(\theta)$ et de $\sin(\theta)$ en fonction de $e^{i\theta}$ et de $e^{-i\theta}$.

Exercice 5.5. Forme trigonométrique

1. Pour quelles valeurs de $\theta \in \mathbb{R}$ a-t-on $1 + e^{i\theta} = 0$?

2. On suppose que $1 + e^{i\theta} \neq 0$. Écrire $1 + e^{i\theta}$ sous forme trigonométrique (indication : utiliser les formules d'Euler de l'exercice précédent).

Exercice 5.6. Racines carrées

Calculer les racines carrées des nombres complexes suivants, sous forme algébrique :

$$z_1 = -1, z_2 = 1 + i, z_3 = -1 - i, z_4 = 1 + i\sqrt{3}, z_5 = 3 - 4i.$$

Exercice 5.7. Racines cubiques

Trouver toutes les solutions dans \mathbb{C} de l'équation $z^3 = i$, sous forme trigonométrique.

Exercice 5.8. Équation du second degré

Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $z^2 + (2 - 3i)z - 5 - i = 0$ (indication : $17^2 = 289$).

Exercice 5.9. Puissances

Calculer $(\cos(2\pi/5) + i \sin(2\pi/5))^{2021}$.

Exercice 5.10. Racines n -ièmes de l'unité

Soit un entier $n \geq 2$.

1. Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z^n - 1 = (z - 1)(z^{n-1} + \dots + z + 1).$$

2. Soit z une racine n -ième de l'unité, différente de 1. Montrer que $z^{n-1} + \dots + z + 1 = 0$.
3. En déduire, par un bon choix de z , que la somme des racines n -ièmes de l'unité est nulle. Donner une interprétation géométrique de ce résultat.

Exercice 5.11. Valeurs de cosinus et de sinus

1. Trouver les solutions z_1 et z_2 dans \mathbb{C} de l'équation $z^2 + z + 1 = 0$.
2. Montrer que z_1 et z_2 sont des racines cubiques de l'unité.
3. Comparer les formes algébriques et trigonométriques de z_1 et z_2 , et en déduire les valeurs de $\cos(2\pi/3)$ et $\sin(2\pi/3)$.

Exercice 5.12. Valeurs de cosinus et de sinus

On rappelle que $e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. Calculer les racines carrées de $e^{2i\pi/3}$ sous forme algébrique et trigonométrique et en déduire les valeurs de $\cos(\pi/3)$ et $\sin(\pi/3)$.
2. Calculer les racines carrées de $e^{i\pi/3}$ sous forme algébrique et trigonométrique et en déduire les valeurs de $\cos(\pi/6)$ et $\sin(\pi/6)$.

Exercice 5.13. Racines n -ièmes de l'unité

Soit un entier $n \geq 2$. On note U_n l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

1. Justifier qu'on peut définir une application $f : \mathbb{Z} \rightarrow U_n$ par $f(k) = e^{2ki\pi/n}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
2. Montrer que si k et l sont deux éléments de \mathbb{Z} tels que $k \equiv l [n]$, alors $f(k) = f(l)$.
3. En déduire qu'il existe une application $g : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow U_n$ telle que pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $g(\bar{k}) = f(k)$, où \bar{k} désigne ici la classe d'équivalence de k dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
4. Montrer que g est une bijection.
5. Montrer que pour tous x, y dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $g(x + y) = g(x)g(y)$.

Exercice 5.14. Linéarisation des puissances de cosinus et sinus

1. En utilisant la formule d'Euler $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ (voir l'exercice 5.4), développer $\cos^3(\theta)$ (c'est la notation courante pour $(\cos(\theta))^3$). En déduire une expression de $\cos^3(\theta)$ comme somme de termes de la forme $\lambda_n \cos(n\theta)$ et $\mu_n \sin(n\theta)$.
2. Même question pour $\sin^3(\theta)$, avec $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.