MQII: Cours 1(résumé)

**Théorie des perturbations
dépendantes du temps
&**

Interaction Matière-Rayonnement

Probabilités de transition $\mathcal{P}_{i \mapsto f}(t)$ (pour $i \neq f$)

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{W}(t) \text{ avec } \hat{H}_0|\phi_n\rangle = E_n|\phi_n\rangle$$

● **Hypothèse:** L'état initial est $|\psi(0)\rangle = |\phi_i\rangle$

$$|\psi(t)\rangle \simeq e^{-i\omega_i t} |\phi_i\rangle - \frac{i}{\hbar} \sum_{k \neq i} e^{-i\omega_k t} \left(\int_0^t e^{i\omega_{k,i}\tau} W_{k,i}(\tau) d\tau \right) |\phi_k\rangle$$

● La **probabilité de transition** $\mathcal{P}_{i \mapsto f}(t)$ est donnée par

$$\mathcal{P}_{i \mapsto f}(t) = |\langle \phi_f | \psi(t) \rangle|^2 \simeq \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t e^{i\omega_{f,i}\tau} W_{f,i}(\tau) d\tau \right|^2$$

Rappel:

$$\omega_{kn} = \omega_k - \omega_n$$
$$W_{kn}(t) = \langle \phi_k | \hat{W}(t) | \phi_n \rangle$$

Exemples de perturbation:

● 2^{em} Cas particulier: une perturbation constante $\hat{W}_0$ durant un intervalle $[0, T]$

$$\hat{W}(t) = \hat{W}_0 \text{ pour } 0 \leq t \leq T \text{ et } \hat{W}(t) = 0 \text{ pour } t < 0 \text{ et } t > T$$

● 3^{em} Cas particulier: une perturbation harmonique durant un intervalle $[0, T]$

$$\hat{W}(t) = \hat{W}_0 \cos \omega t \text{ pour } 0 \leq t \leq T \text{ et } \hat{W}(t) = 0 \text{ pour } t < 0 \text{ et } t > T \text{ (Rq. par définition } \omega > 0)$$

Exemple Générique

Perturbation durant un intervalle $[0, T]$:

$\widehat{W}(t) = \widehat{W}_0 g(t)$ pour $0 \leq t \leq T$
et $\widehat{W}(t) = 0$ pour $t < 0, t > T$

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow f}(t) = |\langle \phi_f | \psi(t) \rangle|^2 \simeq \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t e^{i \omega_{f,i} \tau} W_{f,i}(\tau) d\tau \right|^2$$

$|\omega_{fi}| = |E_f - E_i|/\hbar$ est la fréquence de Bohr de la transition $\phi_i \mapsto \phi_f$

Pour $t \geq T$ on a:
$$\mathcal{P}_{i \rightarrow f}(t) \simeq \frac{|\langle \phi_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2}{\hbar^2} \left| \int_0^T e^{i \omega_{fi} \tau} g(\tau) d\tau \right|^2$$

• **Rappel:** Transformée de Fourier $\hat{f}(\omega)$ d'une fonction $f(t)$:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i \omega t} f(t) dt$$

• **Propriétés:**

- Si $f(t) \in \mathbb{R}$, $\hat{f}(-\omega) = \hat{f}(\omega)^*$
- Inversion de la TF: $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{i \omega t} \frac{d\omega}{2\pi}$

• Ici, posons: $\forall t \in [0, T], g_T(t) = g(t)$ et $\forall t \notin [0, T], g_T(t) = 0 \Rightarrow \mathcal{P}_{i \rightarrow f} \simeq \frac{|\langle \phi_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2}{\hbar^2} |\hat{g}_T(\omega_{if})|^2$

• $g_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{g}_T(\omega) e^{i \omega t} \frac{d\omega}{2\pi} \Rightarrow \mathcal{P}_{i \rightarrow f}$ ne dépend que de l'amplitude $\hat{g}_T(\omega_{fi})$ de la composante de Fourier de $g_T(t)$ à la fréquence de Bohr ω_{fi} . « $\mathcal{P}_{i \rightarrow f}$ agit comme un filtre de fréquence »

• $\hat{g}_T(\omega_{if}) = \hat{g}_T(-\omega_{fi}) = \hat{g}_T(\omega_{fi})^* \Rightarrow \mathcal{P}_{i \rightarrow f} = \mathcal{P}_{f \rightarrow i}$

Résultat toujours vrai, sans approximation: c'est une conséquence des postulats de la MQ.

Perturbation constante

Perturbation constante $\widehat{W}_0$ sur $[0, T]$:

$$\widehat{W}(t) = \widehat{W}_0 \text{ pour } 0 \leq t \leq T$$

$$\widehat{W}(t) = 0 \text{ pour } t < 0, t > T$$

$$\text{Si } t > T \quad \mathcal{P}_{i \rightarrow f}(t) \simeq \frac{|\langle \phi_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2 T^2}{\hbar^2} F\left(\frac{\omega_{fi} T}{2}\right)$$

$|\omega_{fi}| = |E_f - E_i|/\hbar$ est la fréquence de Bohr de la transition $\phi_i \mapsto \phi_f$

$$\bullet \mathcal{P}_{i \rightarrow f} \neq 0 \text{ si } \frac{|\omega_{fi}| T}{2} \lesssim \pi \Leftrightarrow |E_f - E_i| \lesssim \frac{2\pi\hbar}{T}$$

Conservation de l'énergie à $2\pi\hbar/T$ près.

$$F(x) = \frac{\sin^2 x}{x^2}$$

• Approximation aux temps « longs » :

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow f} \simeq \frac{2\pi |\langle \phi_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2}{\hbar} T \delta(E_f - E_i)$$

Résultat de maths:

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty}^{(D)} \alpha F(x \alpha) = \pi \delta(x)$$

$$\Rightarrow F\left(\frac{E_f - E_i}{2\hbar} T\right) \simeq \frac{2\pi\hbar}{T} \delta(E_f - E_i) \text{ pour } T \text{ « grand »}$$

Limite au sens des distributions

- $\mathcal{P}_{i \rightarrow f} \neq 0$ seulement si les états $|\phi_i\rangle$ et $|\phi_f\rangle$ sont dégénérés, i.e. il y a conservation de l'énergie $E_f \simeq E_i$
- $\mathcal{P}_{i \rightarrow f} \propto T \Rightarrow$ on peut parler de **probabilité de transition par unité de temps** c'est le « **taux de transition** »
 $\Rightarrow$ « **Règle d'or de Fermi** » (diapo suivante)

Conséquence: Règle d'or de Fermi

• Rappel: on regarde des transitions entre un état $|\phi_i\rangle$ et un grand nombre d'états $|\phi_f\rangle$ très proches en énergie (mais pas dégénérés: $|\phi_f\rangle = |E_f\rangle$) et constituant un domaine $\mathcal{D}_f$ d'états finaux possibles $\Rightarrow$ situation généralisable au cas où $\mathcal{D}_f$ est un vrai continuum d'états.

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow \mathcal{D}_f} \simeq \Gamma_i T$$

$$\Gamma_i \simeq \frac{2\pi}{\hbar} w(E_i) \rho(E_i)$$

Ces expressions ne dépendent pas en fait du domaine $\mathcal{D}_f \Rightarrow$ on peut prolonger la validité des formules pour tous les états finaux possibles $f \neq i$ ou $\mathcal{D}_f = \{f | f \neq i\}$.

La probabilité $P_i(T)$ que le système soit **toujours dans l'état ϕ_i** au bout du temps T est donc $P_i(T) \simeq 1 - \Gamma_i T$.
Validité? Si $\Gamma_i T \ll 1 \Leftrightarrow T \ll 1/\Gamma_i$

La formule correcte valable « jusqu'aux temps très longs » est

$$P_i(T) = e^{-\Gamma_i T} \Leftrightarrow \mathcal{P}_{i \rightarrow \{f | f \neq i\}} = 1 - e^{-\Gamma_i T}$$

$\Rightarrow$ L'approximation « des temps longs » $\mathcal{P}_{i \rightarrow \{f | f \neq i\}} \simeq \Gamma_i T$ n'est pas valable aux « temps trop longs »!!!

→ L'espérance de vie moyenne « τ » dans l'état $|\phi_i\rangle$ est: $\tau = \int_0^\infty T \frac{d\mathcal{P}_{i \rightarrow \{f | f \neq i\}}}{dT} dT = \int_0^\infty \Gamma_i T e^{-\Gamma_i T} dT = \frac{1}{\Gamma_i}$.

Perturbation Harmonique

Perturbation harmonique durant un intervalle $[0, T]$:

$$\widehat{W}(t) = \widehat{W}_0 \cos \omega t \text{ pour } 0 \leq t \leq T$$

$$\text{et } \widehat{W}(t) = 0 \text{ pour } t < 0, t > T$$

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow f}(t) \simeq \frac{|\langle \phi_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2 T^2}{4\hbar^2} F\left(\frac{(\omega - |\omega_{fi}|) T}{2}\right)$$

$$F(x) = \frac{\sin^2 x}{x^2}$$

- $\mathcal{P}_{i \rightarrow f} \neq 0$ si $\left| \frac{(\omega - |\omega_{fi}|) T}{2} \right| \lesssim \pi \Leftrightarrow \left| \hbar\omega - |E_f - E_i| \right| \lesssim \frac{2\pi\hbar}{T} \Leftrightarrow |E_f - E_i| - \frac{2\pi\hbar}{T} \lesssim \hbar\omega \lesssim |E_f - E_i| + \frac{2\pi\hbar}{T}$

Gain d'une énergie $\Delta E \simeq E_f - E_i$

OU

Perte d'une énergie $\Delta E \simeq E_i - E_f$

Emission « stimulée »

Conséquence: Règle d'Or de Fermi généralisée

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow f} \simeq \frac{|\langle \phi_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2 T^2}{4\hbar^2} F\left(\frac{(\omega - |\omega_{fi}|) T}{2}\right)$$

$$\bullet \mathcal{P}_{i \rightarrow f} \neq 0 \text{ si } \left| \frac{(\omega - |\omega_{fi}|) T}{2} \right| \lesssim \pi \Leftrightarrow \left| \hbar\omega - |E_f - E_i| \right| \lesssim \frac{2\pi\hbar}{T}$$

Résultat de maths:

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \alpha F(x \alpha) = \pi \delta(x)$$

$$\Rightarrow F\left(\frac{\hbar\omega - |E_f - E_i|}{2\hbar} T\right) \simeq \frac{2\pi\hbar}{T} \delta(\hbar\omega - |E_f - E_i|) \text{ pour } T \text{ « grand »}$$

• Limite aux temps « longs » $T \rightarrow +\infty$

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow f} \simeq \frac{\pi |\langle \phi_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2}{2\hbar} T \delta(\hbar\omega - |E_f - E_i|)$$

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow f} \neq 0 \Leftrightarrow E_f = E_i \pm \hbar\omega$$

• Règle d'Or de Fermi généralisée (hypothèses analogues au premier cas):

On note $w(E_f) = |\langle E_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2$ et $\rho(E_f)$ la densité d'états alors

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow \{f | E_f \gtrless E_i\}} \simeq \Gamma_i^\pm T \text{ avec } \Gamma_i^\pm = \frac{\pi}{2\hbar} w(E_f^\pm) \rho(E_f^\pm) \text{ et } E_f^\pm = E_i \pm \hbar\omega$$

• Remarques:

- Pour $E_i + \hbar\omega = E_f > E_i$, $\mathcal{P}_{i \rightarrow \{f | E_f > E_i\}}$ décrit la probabilité d'excitation à un niveau d'énergie plus grand. Ceci n'est possible que si $\rho(E_f = E_i + \hbar\omega) \neq 0$, i.e. il existe bien des états tels que $E_f = E_i + \hbar\omega$.
- Si $E_i - \hbar\omega = E_f < E_i$, $\mathcal{P}_{i \rightarrow \{f | E_f < E_i\}}$ décrit la probabilité de relaxation vers un niveau d'énergie plus faible. Ceci n'est possible que si $\rho(E_f = E_i - \hbar\omega) \neq 0$, i.e. il existe bien des états tels que $E_f = E_i - \hbar\omega$.

Application: Absorption et Emission stimulée

$$\vec{\mathcal{E}}(\vec{0}, t) = \varepsilon_0 \cos \omega t \vec{e} \Rightarrow \widehat{W}(t) = \widehat{W}_0 \varepsilon_0 \cos \omega t \text{ avec } \widehat{W}_0 = -\vec{D} \cdot \vec{e}$$

Hamiltonien de l'atome: $\widehat{H}(t) = \widehat{H}_0 + \widehat{W}(t)$
 => Application Exemple Harmonique

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow f}(T) \simeq \frac{|\langle \phi_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2 \varepsilon_0^2 T^2}{4\hbar^2} F\left(\frac{(\omega - |\omega_{fi}|) T}{2}\right)$$

Energie

● Excitation

OU

● Relaxation

● **Absorption** par l'atome d'un photon d'énergie $\Delta E \simeq E_f - E_i$

● **Emission** par l'atome d'un photon d'une énergie $\Delta E \simeq E_i - E_f$

Emission
« stimulée »

● Limite aux temps longs

$$\mathcal{P}_{i \rightarrow f} \simeq \frac{\pi |\langle \phi_f | \widehat{W}_0 | \phi_i \rangle|^2}{2\hbar} \varepsilon_0^2 T \delta(\hbar\omega - |E_f - E_i|)$$

Cours1: Résumé

FIN COURS 1 Résumé