Signalisations au cours du développement des Vertébrés 3

Patrick PLA
Université Paris Saclay

<https://bcgdevelop.fr/>

Partie 5
**Régionalisation selon les axes proximo-distal
et antéro-postérieur du bourgeon de membre**

Un rassemblement de cellules d'origines variées

Fig. 9.19 Transverse section through trunk region of 3-day chick embryo. The blue color is the product of *in situ* hybridization for mRNA of the transcription factor *LBX1*, and indicates myoblasts migrating into the limb buds. Reproduced from Bryson-Richardson and Currie. *Nat Rev Genet* 2008; 9: 632–646, with permission from Nature Publishing Group.

Une structure en 3D

Croissance du bourgeon de membre selon l'axe proximo-distal

Fig. 10.5 The development of the chick wing and mouse forelimb are similar. The skeletal elements are laid down, as cartilage, in a proximo-distal sequence as the limb bud grows outward. The cartilage of the humerus is laid down first, followed by the radius and ulna, wrist elements, and digits. Scale bar = 1 mm.

**Un épiderme épaissi à l'extrémité distale du bourgeon de membre :
l'AER (Apical Ectodermal Ridge = crête apicale ectodermique)**

Ablation de l'AER à différents moments du développement

Action de l'acide rétinoïque sur la régénération chez la salamandre

Fig. 20.19 Proximalization of blastema by retinoic

Membre antérieur

Membre postérieur

Sauvage

Meis1^{+/+}
Meis2^{-/-}

Meis1^{-/-}
Meis2^{-/-}

***Meis1* et *Meis2* sont nécessaires au développement des structures proximales du bourgeon de membre**

Préparations squelettiques d'embryons sauvages de souris et de mutants *Meis* colorés au bleu alcian, qui colore les cartilages, et au rouge alizarine, qui colore les os, à 18,5 jours de développement. Les mutants sont des embryons porteurs du système de délétion conditionnelle Cre/Lox, qui permet de restreindre l'inactivation des gènes *Meis* au membre postérieur. Le membre antérieur, non affecté, sert de témoin. Dans les résultats présentés, le premier mutant possède une copie fonctionnelle de *Meis1*, mais n'exprime plus *Meis2*. Le second mutant n'exprime plus ni *Meis1*, ni *Meis2*.

Auteurs : Delgado et coll., 2020

Expression de *Fgf8* dans l'AER et effet de l'acide rétinoïque

Expression des gènes *Meis* quand l'AER n'exprime plus de FGF

Hybridation *in situ*
avec une sonde radioactive
(ne s'utilise plus à
notre époque !)

Voies de signalisation activées par les FGF

Le patron d'expression des gènes *Hox* présente 2 phases dans le bourgeon de membre

Effet des mutations des groupes paralogues de gènes *Hox* sur le membre chiridien

WT

Hox10^{-/-}

Hox11^{-/-}

Hox13^{-/-}

Lorsqu'on réalise l'invalidation des gènes *Hox* du groupe de paralogie 10 chez la souris, le stylopode est très réduit. C'est le zeugopode qui est réduit après invalidation des gènes *Hox* du groupe de paralogie 11. Les doigts à l'extrémité de l'autopode ne se développent pas après invalidation des gènes *Hox* du groupe de paralogie 13.

Exemple d'une famille avec une synpolydactylie causée par la présence d'un ou deux allèles mutants non-sens de *HOXD13*

Les séquences régulatrices des gènes *Hox* sont en grande partie conservées chez les Vertébrés

Lépisostéidé

Island I

CsB

Gène rapporteur *LacZ* sous le contrôle des séquences régulatrices

La ZPA et l'axe antéro-postérieur du bourgeon de membre

Fig. 11.14 La zone à activité polarisante (ZPA) peut spécifier des informations positionnelles le long de l'axe antéro-postérieur. Si la ZPA est la source d'un gradient de concentration d'un morphogène, les différents doigts pourraient être spécifiés à différents seuils de concentration du signal, comme cela est montré pour une aile normale de poulet dans les illustrations du haut, dans laquelle le doigt 4 se forme là où la concentration est la plus élevée et le doigt 2 là où elle est faible. Les seuils de concentration du morphogène qui spécifient

les différents doigts sont représentés dans la colonne centrale, et les doigts formés révélés dans les photographies à droite avec des rappels de couleur. La greffe d'une zone à activité polarisante additionnelle dans la région antérieure du bourgeon d'aile (illustrations au centre) conduirait à une duplication en miroir du gradient de signal et donc à la duplication observée des doigts. La greffe d'un petit nombre de cellules de la ZPA dans la région antérieure du bourgeon ne produit qu'un faible signal et seul un doigt 2 additionnel se forme (illustrations du bas).

(A)

Hybridation
in situ
Shh

(B) Stage 19-23 embryo

Shh est exprimé dans la ZPA et est suffisant pour la remplacer dans les greffes

Effet du KO de *Gli3* sur le développement des membres

Rappel
sur la voie de signalisation
Shh

Chez les Bovins, le gradient de Shh est altéré par manque de rétrocontrôle inhibiteur de Ptch I

Comment transformer une patte de souris en patte de vache

Mutation
qui rend
l'expression
de *Ptch1*
moins sensible
à la voie de signalisation
Shh

Effet du remplacement d'un enhancer de souris par un enhancer de serpent dans les séquences régulatrices de *Shh*

FIGURE 25.10 (A) The snake limb enhancer for *Shh* is missing an element (ETS1) that is crucial for directing limb development. When the snake *Shh* enhancer replaces the mouse *Shh* enhancer in embryonic mice, very little *Shh* (dark blue) is seen in the limb buds, and the mouse develops a truncated limb. (B) If the missing ETS1 site from the mouse *Shh* enhancer (or other reptilian *Shh* enhancers) is added to the snake enhancer, it functions normally, directing mouse *Shh* expression in the limb buds and making full-length limbs. (After E. Z. Kvon et al. 2016. *Cell* 167: 633–642.)

Effet de l'ablation de l'AER sur l'expression de Shh dans la ZPA

Les FGF de l'AER et Shh de la ZPA maintiennent mutuellement leur expression

Partie 5

Régionalisation selon les axes du bourgeon de membre

La crête ectodermique apicale (AER), un épaissement ectodermique distal, produit des facteurs de croissance FGF (notamment FGF4 et FGF8) essentiels à la croissance du bourgeon.

L'AER maintient une zone de prolifération mésenchymateuse sous-jacente. Un gradient d'acide rétinoïque provenant du tronc spécifie les identités proximales (en activant l'expression des facteurs de transcription Meis 1/2), tandis que les FGF de l'AER induisent les structures distales (en inhibant l'expression de Meis 1/2).

Plus en aval, une partie des complexes *HoxA* et *HoxD* régulent la régionalisation proximo-distale selon la règle de colinéarité : les gènes en 3' (comme *Hoxa9*) spécifient les régions proximales, tandis que les gènes en 5' (comme *Hoxa13* et *Hoxd13*) spécifient les éléments distaux (les doigts).

La zone d'activité polarisante (ZPA), située postérieurement, sécrète Shh.

Sa greffe antérieure provoque une duplication miroir des doigts. La concentration et la durée d'exposition à Shh déterminent la spécification des doigts (pouce → petit doigt).

ZPA et AER se maintiennent mutuellement : Shh soutient l'expression des FGF dans l'AER et les FGF soutiennent l'expression de Shh dans la ZPA.