Éléments mobiles et instabilité génétique

Mutagénèse par insertion de transposons

TRANSPOSON = fragments d'ADN qui sont insérés dans le génome d'un organisme hôte et qui ont la propriété remarquable de se déplacer d'un point à un autre du génome

-> parasitisme moléculaire des génomes

Pas de génome dépourvu de transposons !

maïs 1950

B. Mc Clintock :

Instabilité génétique = remaniements chromosomiques

-> éléments transposables (ETs) Ac/Ds

Ac = activateur

Ds = dissociateur

bactéries 1970

Séquences IS (Insertion Sequences)

-> résistances aux antibiotiques

S. cerevisiae 1980

Rétrotransposon Ty

D. melanogaster 1980

Transposons famille Copia, Eléments P

Rétroéléments famille Gypsy

C. elegans 1980

Transposons famille Tc1

H. sapiens 1980

**Rétroéléments de types
LINE et SINE**

Champignons filamenteux 1990

**Transposons familles Copia, Tc1/mariner, pogo
Rétroéléments famille Gypsy**

Taille de génomes et proportion d'ADN répété

Localisation des séquences d'ADN répété dans les génomes d'eucaryotes

ADN répété, facteur d'instabilité chromosomique

Délétions :

ADN répété, facteur d'instabilité chromosomique

Inversions :

ADN répété, facteur d'instabilité chromosomique

Amplifications :

ADN répété, facteur d'instabilité chromosomique

Recombinaisons -> **translocations** :

Intégration de l'épisome F dans le chromosome bactérien

Transposons eucaryotes

Transposon type I = rétro-transposons à ARN

Reverse transcriptase

Copier & coller

Transposable
element

Couper & coller

Transposase

Transposon type II = transposons à ADN

Insertion au hasard dans les génomes

Structure des transposons de type I

❖ Rétrotransposons à LTR: ty3/gypsy

❖ Rétrotransposons sans LTR

❖ Rétrotransposons à LTR: ty3/gypsy

❖ Errantiviruses

Transposons de type I ou rétro-transposons

Mécanisme de transposition :

copier + coller

intermédiaire ARN

Structure des transposons à ADN de type II

✓ Transposons autonomes

Tc1/mariner

✓ Transposons non autonomes

ITR = Inverted Terminal Repeat

CAGC . . .
GTCG . . .

. . . GCTG
. . . CGAC

Transposition conservative

couper + coller

Mécanisme d'insertion transposon type II

Duplications : 2-14 pb, taille constante pour un ET donné

-> signature

Excision des ETs

Parfaite

-> Recombinaison entre séquences répétées en tandem (TDS)

-> restauration de la séquence sauvage

Fréquence de transposition / excision

❖ Transposons ARN type I

Ty *S. cerevisiae*

Transposition : 1 / 20 générations env 10^{-6}

Excision : env 10^{-5} à 10^{-6}

❖ Transposons ADN type II

Transposon bactérien

Transposition : env 10^{-6}

Excision : env 10^{-6}

Élément P *drosophile* : croisement mouche vide de P par mouche P

Transposition : env 10^{-3} à 10^{-4} soit 10^3 fois plus
que taux de mutation spontanée

Excision : jusqu'à quelques %

Mobilité des transposons et expression génique

❖ Insertion :

- ✓ **Dans une phase codante** : interruption de l'ORF, protéine tronquée
- ✓ **Dans un intron** :
 - **Pas d'effet !**
 - **Arrêt de la transcription dans le transposon** : protéine tronquée
 - **Epissage incorrect** : protéine chimère
- ✓ **Dans une séquence promotrice** :
 - **Dérégulation de l'expression du gène concerné**

Mobilité des transposons et expression génique

❖ Excision imparfaite :

✓ Dans une phase codante :

- ❖ Si pas multiple de 3 -> **décalage** du cadre de lecture
- ✓ Recombinaison sur les LTRs : une LTR (solo) reste au site d'**insertion**
- ✓ Cassure double brin et réparation imparfaite : **délétion** de matériel génomique de part et d'autre du point d'insertion
- ✓ Réarrangement : addition (**insertion**) de matériel génomique

**Recherche de mutants non pathogènes
chez *Klebsiella pneumoniae* par
mutagénèse insertionnelle**

Klebsiella pneumoniae

Entérobactérie **commensale**, encapsulée, à gram négative

Si pathogène : infections respiratoires
-> pneumonies, abcès pulmonaires, pleurésies et des
infections intestinales

Intérêt de la mutagenèse insertionnelle

- ✓ Insertion au hasard dans le génome
- ✓ Facilité de localisation des gènes affectés
 - « étiquetés » grâce au transposon

Recherche de mutants non pathogènes

Sélection de mutants => crible phénotypique

Identification des gènes affectés
pour chacun des mutants

Modèles théoriques

Hypothèses de travail

Tn5 : un transposon composé

mini-Tn5 : un transposon composé défectif

Episome à répllication conditionnelle

Bactérie
exprimant π

Bactérie
n'exprimant pas π

Répllication
Épisome π

Oui

Non

Protocole de mutagenèse

F' = *E. coli*

F- = *K. pneumoniae*

[Strep^S]
[Kan^R]
[π^+]

[Strep^R]
[Kan^S]
[π^-]

Sélection des conjugants
LB + Kan + Strep

F- = *K. pneumoniae* [Strep^R] [Kan^R]

Crible phénotypique de sélection de mutants non pathogènes

Hyperviscosité [HV+]

Hyperviscosité [HV+]

Pas d'hyperviscosité [HV-]

Résultats du crible

2500 conjugants analysés

15 mutants [HV-]

Sélection de mutants => crible phénotypique

**Identification des gènes affectés
pour chacun des mutants**

Modèles théoriques

Hypothèses de travail

Identification des gènes mutés par PCR inverse

Identification des gènes mutés

✓ Si la séquence complète du génome est disponible

Séquences flanquantes

Algorithme « BLAST »

Comparaison avec la banque génomique

-> recherche de la séquence nucléotidique complète

PROTEINE

FONCTION

Identification des gènes mutés

✓ Si la séquence complète du génome n'est pas disponible

Séquences flanquantes

Amorces
spécifiques

K. pneumoniae [HV⁺]

Extraction
ADN génomique

Amplification PCR

Séquençage de
l'allèle interrompu

6 protéines hypothétiques déduites de la séquence nucléotidique

Algorithme « BLAST »

Comparaison avec des banques de protéines

-> recherche de similitude entre une séquence fournie
et toutes les séquences contenues dans une base de
données (*E. coli*)

FONCTION

Gènes identifiés

- 10** *cps* -> synthèse polysaccharide de capside
- 1** *wb* -> synthèse lipopolysaccharide
- 2** *rmpA* -> régulateur de synthèse polysaccharides de capside
- 2** *magA* -> proteine hypothétique, 43 kD
lipoprotéine membranaire putative

Vérifications

❖ Complémentation fonctionnelle

❖ Disruption de l'allèle *magA*⁺

MagA -> production exopolysaccharides

9 segments transmembranaires

Nouvelle cible thérapeutique !

Sélection de mutants => crible phénotypique

Identification des gènes affectés
pour chacun des mutants

Modèles théoriques

Hypothèses de travail

Effets polaires

Effets polaires

Transcription

Mutations:
➤ Signal fin de transcription
➤ ARNm tronqué

Translation

Protein 1

Pas de protéine 2 même si ORF2 n'est pas touchée
=> Conséquence structure polycistronique

Effets polaires

Mutations
➤ **stabilité messagers**

Pas de protéine 1 ni de protéine 2 même si ORF2 n'est pas touchée
=> Conséquence structure polycistronique

**Identification des gènes essentiels chez la
levure *S. cerevisiae* par mutagénèse
insertionnelle saturée**

Principe du crible SATurated Transposon Analysis in Yeast (SATAY)

MiniDS
Transposon

pGal-Ac
Transposase

Protocole de mutagenèse

ADE2::MiniDS

pGal-Ac

[Ade⁻]

+ Gal

ADE2+

gèneX::MiniDS

pGal-Ac

[Ade⁺]

Sélection transposants

MM

Protocole d'identification des gènes mutés

■ transposon
■ non-essential genes
■ essential genes

inserted in non-essential genes

inserted in essential gene

2-genomic DNA extraction

3-digestion with frequent-cutter

4-intramolecular ligation

5-PCR

6-sequencing

Résultats du crible

Prp45 => requise pour l'épissage des ARN pré-messagers

Analyse structure / fonction

Site
catalytique

Prp45
domaine
essentiel

ARN pré-messager

Les interactions géniques

Test de complémentation

&

exceptions

Sélection de mutants => crible phénotypique

**Identification des gènes affectés
pour chacun des mutants**

Modèles théoriques

Hypothèses de travail

Sélection de mutants de levure [ura⁻]

N expériences $\rightarrow$ N mutants [ura⁻] indépendants
M1, M2, M3, M4 ...

Test de complémentation

[ura⁻] M1 **X** M2 [ura⁻]

Hypothèse 1 : M1 et M2 sont mutés dans le **MEME gène** (2 sites mutationnels)

- **3 allèles** du gène *Ura1* -> allèle sauvage *urA1⁺* [ura⁺]
- > allèle mutant *urA1₁⁻* [ura⁻] (récessif, 1 site muté)
- > allèle mutant *urA1₂⁻* [ura⁻] (récessif, 1 site muté)

Test de complémentation

[ura⁻] M1 X M3 [ura⁻]

Hypothèse 2 : M1 et M3 sont muté dans **DEUX gènes DIFFERENTS**

- **1 gène *UrA1***, 2 allèles -> allèle sauvage *urA1+* [ura⁺]
-> allèle mutant *urA1-* [ura⁻] (récessif, 1 site muté)
- **1 gène *UrA3***, 2 allèles -> allèle sauvage *urA3+* [ura⁺]
-> allèle mutant *urA3-* [ura⁻] (récessif, 1 site muté)

[ura⁻] M1 *urA1-* *urA3+* X *urA1+* *urA3-* M3 [ura⁻]

Fécondation

urA1+ > *urA1-*
urA3+ > *urA3-*

urA1- *urA3+*
urA1+ *urA3-*

Alors diploïde -> [ura⁺] = **COMPLEMENTATION FONCTIONNELLE**

Test de dominance récessivité

M1 X WT

Si $urA1^+ > urA1_{1}^-$ alors diploide [*ura*⁺]

Test de dominance récessivité

M2 X WT

Si $urA1^+ > urA1_2^-$ alors diploide [*ura*⁺]

Test de dominance récessivité

M3 X WT

Si $UrA3^+ > UrA3_1^-$ alors diploïde [ura^+]

Test de complémentation

M1 X M2

diploide [ura⁻]

Test de complémentation

M1 X M3

diploide [ura^+]

Test de complémentation

M2 X M3

diploide [ura^+]

Groupes de complémentation

	M1	M2	M3
M1	-		
M2	-	-	
M3	+	+	-

- ◇ **Groupe de complémentation 1 : M1 et M2**
- ◇ **Groupe de complémentation 2 : M3**

**3 mutants mais seulement 2 gènes identifiés: *urA1*, 2 allèles
urA3, 1 allèle**

Exceptions au test de complémentation

M4

haploïde [ura⁻]

WT
X
M4

diploïde [ura⁺]

Exceptions au test de complémentation

M5

haploïde [*ura*⁻]

WT
X
M5

diploïde [*ura*⁺]

Exceptions au test de complémentation

Exceptions au test de complémentation

Exceptions au test de complémentation

Exceptions au test de complémentation

Exceptions au test de complémentation

	M1	M2	M3	M4	M5
M1	-				
M2	-	-			
M3	+	+	-		
M4	-	-	+	-	
M5	+	+	+	⊖	-

- ◇ Groupe de complémentation 1 : M1, M2, M4
 - ◇ Groupe de complémentation 2 : M3
 - ◇ Groupe de complémentation 3 : M5 M4
- } M4
1 site muté
&
2 gènes touchés
urA1 et *urA2*

➡ 5 mutants mais seulement 3 gènes identifiés: *urA1*, 3 allèles
urA2, 2 allèle
urA3, 1 allèle

Exceptions au test de complémentation

Complémentation intra-génique (ex. *Neurospora crassa*) :

3 allèles du gène *Trp3*

- > allèle sauvage *trp3⁺* [trp⁺]
- > allèle mutant1 *trp3¹⁻* [trp⁻]
- > allèle mutant2 *trp3²⁻* [trp⁻]

trp3⁺ > trp3¹⁻

trp3⁺ > trp3²⁻

actif

trp3⁺
trp3⁺

inactif

trp3¹⁻
trp3¹⁻

inactif

trp3²⁻
trp3²⁻

actif

trp3¹⁻
trp3²⁻

protéines homo-multimériques : mutations altérant la charge

Exceptions au test de complémentation

Complémentation intra-génique (ex. *Saccharomyces cerevisiae*):

3 allèles du gène *His4*

- > allèle sauvage *his4⁺* [his⁺]
- > allèle mutant1 *his4¹⁻* [his⁻]
- > allèle mutant2 *his4²⁻* [his⁻]

his4⁺ > his4¹⁻

his4⁺ > his4²⁻

Protéines présentant au moins deux fonctions enzymatiques distinctes,
portées par deux domaines distincts

Exceptions au test de complémentation

Absence de complémentation (haplo-insuffisance) :

Protéine actine (*S. cerevisiae*) codée par *ACT1*

Mutations *act1-1* & *act1-4* (allèles récessifs) -> thermosensibilité

Protéines TPM1 et SAC6 interagissent avec le cytosquelette d'actine

<i>act1-1 TPM1+</i> / <i>ACT1+</i> <i>tpm1-</i>	thermorésistant
<i>act1-4 TPM1+</i> / <i>ACT1+</i> <i>tpm1-</i>	thermorésistant
<i>act1-1 SAC6+</i> / <i>ACT1+</i> <i>sac6-</i>	thermorésistant
<i>act1-4 SAC6+</i> / <i>ACT1+</i> <i>sac6-</i>	thermosensible

Modèles expliquant l'absence de complémentation :

Protéines hétéro-multimériques (interactions stoechiométriques)

❖ Effet de dose

act1-4 SAC6+ / ACT1+ SAC6+

1/2 complexes actifs
➤ Fonctionnels

ACT1+ SAC6+ / ACT1+ sac6-

1/2 complexes actifs
➤ Fonctionnels

act1-4 SAC6+ / ACT1+ sac6-

1/4 complexes actifs
➤ **NON fonctionnel**

❖ Effet poison

act1-4 SAC6+ / ACT1+ sac6-